

3 à 5cc. de la sol. à 1% préparée à froid. — Inj. endov. ou intrach. (ménингite). A cause des impuretés contenues dans le collargol, son usage hypodermique peut conduire à des accidents rénaux. On doit lui préférer, pour cet usage, l'agent colloïdal électrique. (Argosol).

Argosol (argent colloïdal électrique stable, isotonique.) — (V. *Electrosol métalliques* (p. 9)).

Arrhénal. — (V. *Méthylarsinate de soude*).

Arsacétine (*nom déposé*). — Dérivé acétyle de l'atoxyl. — Serait moins毒 que l'atoxyl.

Atoxyl (non déposé). — Sel monosodique de l'anilide de l'acide ortho-arsénique. — S. eau. — P. T.: Antisyphilitique, antiparasitaire. — Ind.: Succédané du Hg. dans la syphilis. Alterner inj. d'atoxyl avec traitement mercuriel. — Actif dans trypanosomiases. — Pos.: 50 à 60 centigr. chez l'homme, 40 centigr., chez la femme, tous les 2 à 3 jours et une inj. sous-cut. Faire une série de 3 injections. *Non douloureux.* — On a attribué à l'atoxyl des accidents graves de l'appar. oculaire.

Atropine. — F. us.: Sulfate et valérianate. — S. eau. — P. T.: Sédatif douleur, antispasmodique et antiémétisant, accélérateur du pouls et du cœur, antisudoral, antisécréteur, mydriatique. — Ind.: Névralgies rebelles, vomissements, coliques hépatiques et néphrétiques, sueurs tubercul., brachycardie convalescents. — Antidote de la mucéanine dans ampoisou. par champignous. Pos.: 1 milligr. sulf. atropine par 24 h. *au maximum.* — *Très toxique.* — Assoc.: Avec morphine dont elle corrige quelques inconvenients (nausées, ralentissement du cœur) comme antiémétique et adjuvant de la narcose chloroformique (½ mill. sulf. atropine, 1 centigr. morphine. — 2 à 3 cc. avant la narcose). — Avec strychnine comme antiémétique et antispasmodique.

B

Benzenégénol (nom déposé). — (Benzoate d'eugénol). — P. T.: Anti-