Les Pomotes, qu'on appelle généralement *Crapets*, se trouvent dans presque tous nos lacs. De taille plus petite, leur chair est aussi beaucoup moins estimée que celle des Bars et des Achigans.

On en compte deux espèces.

Opercule avec tache rouge à l'extrémité..... 1. *vulgaris.*
Opercule sans tache rouge à l'extrémité..... 2. *appendix.*

1. Le Pomote commun. *Pomotis vulgaris*, Cuvier. Fig. 16. —Anglais : *Common Pond fish ; Sun fish ; Bream.* — Long. 6 à 7 pouces.

Formule ptérygiale : D. 10-12; P. 13 ; V. 1-5; A. 3-10; C. 17.

D'un verdâtre brun en dessus avec des taches de rouille irrégulièrement distribuées, quelquefois ces taches en bandes longitudinales presque régulières. De belles lignes ondulées, d'un bleu foncé, traversent longitudinalement les opercules. Membrane de l'opercule noire avec une brilliante bordure écarlate à son extrémité. Ventre blanchâtre. Ventrales et pectorales jaunâtres, les autres nageoires d'un brun foncé. Corps presque aussi large que long, très comprimé.



FIG. 16.

Ce joli petit Crapet se rencontre dans tousnos marais. Il fraye au printemps et se prépare un nid souvent de plus de 2 pieds de diamètre, en faisant disparaître les herbes ou la vase du fond pour laisser le gravier à nu. On les voit toujours près de ces nids qui souvent ne sont guère à plus de 12 à 15 pouces d'épaisseur d'eau. Avec un peu d'adresse on le saisit alors à la main sans le secours d'aucune ligne. Il suffit de s'avancer doucement près des nids en

Fig. 16.—Le Pomote commun. *Pomotis vulgaris*, Cuvier.