

bosselure de l'utérus. J'essayai encore inutilement à faire la version. Les contractions étaient si fortes, que, du moment qu'on touchait au corps du fœtus, en moins d'une minute, les doigts étaient pris de crampes. Nous administrâmes les opiacés, et nous fîmes tenir la femme sur un vase d'eau chaude, et lui fîmes prendre des bains de sièges. N'obtenant rien, et quoique la femme ne fût pas très forte, nous employâmes la saignée, sans cependant pouvoir obtenir la syncope.

La saignée parut relâcher un peu ce spasme de l'utérus et je pus faire parvenir ma main jusqu'à la hauteur des genoux, où je sentis la masse placentaire, et me convainquis que l'enfant était droit, les pieds à l'ombilic.

Il était près de midi ; l'enfant était mort depuis plusieurs heures : voyant l'inutilité de nos efforts, nous résolûmes d'opérer la section de ce prétendu pédicule. Ce n'était pas une petite affaire : la hauteur où se trouvait l'implantation, environ au tiers inférieur de l'utérus ; le peu d'instruments à notre disposition et, dans tous les cas, la presque impossibilité de s'en servir ; le danger de déchirer l'utérus, c'était tout autant de difficultés, sans compter que nous commencions à être épuisés tous deux par nos tentatives antérieures. Cependant nous nous mîmes résolument à l'œuvre. Le bras descendant, gênant nos manœuvres, et ne pouvant le faire remonter, on en fit la section et, après une heure de peines et de fatigues incroyables, (nous ne pouvions employer, pour ainsi dire, que les doigts) nous avions enfin le bonheur de voir le pédicule complètement détaché. Des tractions furent faites sur le corps ; mais la résistance se faisait encore sentir : alors nous enlevâmes les viscères thoraciques, et après cela le reste du corps fut retiré sans trop de difficulté.

Je dis à mon confrère d'aller chercher le placenta tout de suite, de crainte d'une nouvelle rétraction de l'utérus. Au lieu du placenta, il sortit une tête monstrueuse, de la grosseur de celle d'un enfant d'un an. Ayant de nouveau porté la main dans la matrice, il en retira facilement le placenta.

La tête se trouvait renfermée dans une espèce de sac, dont les bords étaient resserrés de telle sorte sur le cou que celui-ci paraissait collé sur la muqueuse ; la sortie du corps ayant fait cesser la contraction, la tête était tombée dans la cavité de l'utérus. Pendant tout ce temps la femme n'avait éprouvé de fortes douleurs, que lorsqu'on essayait à faire la version. Nous la mîmes dans son lit pas aussi faible qu'on aurait pu se l'imaginer, et lui prescrivîmes une diète rigoureuse. Elle releva assez promptement, n'ayant eu pour toute incommodité qu'une incontinence d'urine qui dura quelques jours. L'inflammation des parties externes se dissipa bientôt et, au bout de deux ou trois semaines, elle put commencer à vaquer à son ménage. Elle n'a pas eu d'enfant depuis.