

tingue alors deux cas : ou l'œuf est mort, ou l'œuf est vivant. Si l'œuf est mort, on n'observe d'abord aucun symptôme important, puis survient un écoulement de sang noirâtre avec de petits caillots. Cela dure de six à 8 jours sans douleurs bien vives ; tout ce que le malade éprouve, c'est un peu de malaise général. Alors seulement apparaissent les véritables douleurs, le col se dilate, l'œuf s'engage, on parvient à le retirer et tout rentre dans l'ordre. Quelquefois l'œuf mort est expulsé immédiatement ; alors il s'écoule un sang abondant mais cependant de même nature, et les douleurs qui accompagnent l'hémorragie sont excessivement vives. Si l'œuf est vivant, les douleurs apparaissent d'abord, ensuite vient l'hémorragie.

Du troisième au quatrième mois, l'accouchement a ordinairement deux temps, le fœtus se présente en premier lieu, le placenta immédiatement après ou quelquefois au bout de 3, 5, 8 jours. L'hémorragie cesse lorsque le placenta est sorti. Quelquefois le médecin est obligé d'intervenir, mais il faut que cela se fasse avec beaucoup de prudence. Si la suite n'est pas suffisamment engagée ou s'il ne voit pas la possibilité de l'extraire toute à la fois, son intervention prématurée peut avoir des résultats fâcheux. La matrice se referme en emprisonnant une partie du placenta et il peut s'en suivre une métrite ou une fièvre putride très-dangereuse.

Diagnostic.—Voici d'après Charpentier les quatre questions que doit se poser tout médecin qui est appelé auprès d'une femme qui perd du sang :

1^o Est-elle oui ou non sous le coup d'un avortement ?

2^o La femme étant sous le coup d'un avortement, peut-on, oui ou non, arrêter cet avortement ?

3^o Appelé trop tard, n'ayant pas assisté au début ; l'avortement est-il fait ou non ?

4^o L'avortement est fait complètement mais il y a des accidents consécutifs, que reste-t-il à faire ?

1^o La femme est-elle oui ou non sous le coup d'un avortement ?

Pour se fixer sur ce point, on s'informe de la qualité du sang déjà perdu. Si ce sang est abondant, s'il est venu par caillots, on a déjà une quasi certitude que la femme est enceinte. Puis au bout de 24 à 48 heures viennent les douleurs de reins accompagnées d'une hémorragie intermittente qui concourent à nous raffermir sur notre diagnostic. Enfin nous avons le toucher. Sous l'influence du sang perdu et des contractions de la matrice, le col s'est entr'ouvert ; le doigt sent un corps souple quoique résistant déjà engagé. Alors il n'y a plus de doutes, le diagnostic est certain.