

On fait trois injections par jour et on injecte chaque fois, immédiatement après une miction et le malade étant placé dans le décubitus dorsal, environ 8 grammes du mélange que le malade retient pendant dix à vingt minutes dans l'urèthre. La première injection doit être faite par le médecin.

D'après M. Thiery, les douleurs disparaissent après la première injection et la guérison s'obtient au bout de douze jours.

La Clinique.

Injection contre la leucorrhée

HENSKE.

Chlorate de potasse.....	30 grammes.
Teinture d'opium.....	30 —
Eau de goudron.....	470 —

Faites dissoudre.—Deux ou trois cuillerées à bouche dans un litre d'eau tiède, pour injections matin et soir, dans le cas d'écoulement leucorrhéique.— N. G.

L'Union Médicale

Le chlorhydrate d'ammoniaque dans les affections du foie.

Stewart, se fondant sur un grand nombre de faits observés dans les hôpitaux de l'Inde, place le chlorhydrate d'ammoniaque au premier rang des médicaments à essayer dans les affections du foie. C'est en particulier dans la congestion du foie et l'hépatite aiguë que les résultats seraient remarquables. Ils peuvent l'être également dans les abcès et Stewart rapporte un fait détaillé d'abcès profond du foie qui avait guéri en un mois par cette médication. Les hépatites chroniques, les cirrhoses alcooliques et cardiaques sont beaucoup moins modifiées. Le chlorhydrate est surtout utile au début, à la période de simple congestion.

Les doses données ont varié de 1 gr. 50 à 3 grammes par jour, administrés en trois fois dans les vingt-quatre heures. Les sueurs abondantes qui surviennent fréquemment ne sont nullement une cause d'affaiblissement et ne doivent pas faire suspendre l'emploi du chlorhydrate.— *The Lancet.*