

que latente. Les éléments acnéiques sont roses, rouges, d'une couleur franche ; les papules syphilitiques ne sont pas d'un rouge franc, elles sont cuivrées, jaunes. Les papules acnéiques de la couperose, infectées par les microbes de la suppuration, suppurent ; les papules syphilitiques ne suppurent pas ; elles s'ulcèrent et laissent des cicatrices petites, lisses, déprimées, régulières, d'abord cuivrées, puis blanchâtres.

Quand vous êtes en présence d'une couperose dans sa troisième forme, à son troisième degré, si vous voulez, vous devez d'abord examiner si votre malade n'a point un *lupus tuberculeux* du nez. Les différences sont relatives surtout à l'aspect des nodules lupiques qu'il faut chercher avec soin. Ces nodules sont translucides, ils ont une coloration sucre d'orge, suivant la comparaison culinaire et très exacte employée par tous. Ces grains sucre d'orge isolés ou plus souvent agglomérés ne peuvent pas être confondus avec des papules d'acné. Parmi les nodules tuberculeux du lupus, il en est qui ont une tendance à l'ulcération, mais toujours on en trouve qui disparaissent sans ulcération par atrophie cicatricielle. Même autour des premiers, on ne trouve pas les mêmes phénomènes congestifs, on ne trouve pas une rougeur érythémateuse aussi développée que dans la couperose à sa dernière période.

En présence d'une acné hypertrophique, vous devez ensuite peser les raisons qui pourraient militer en faveur de la lèpre.

L'erreur est facile à éviter si on pense à sa possibilité ; elle est fréquente parce qu'on n'y pense pas. Si vous songez à la lèpre, prenez une épingle, piquez et le diagnostic est fait dans un sens ou dans l'autre suivant que la piqûre est ou n'est pas ressentie. Pour vous y faire songer, voici quels symptômes attireront votre attention. Les tubercules lépreux ne sont pas aussi rouges, d'une couleur aussi foncée que les éléments de l'acné ; ils sont blanc-rose, un peu jaunâtres ; ils s'accompagnent de peu de congestion périphérique ; les tubercules lépreux sont rarement localisés au nez et sur les joues ; il y en a au front. Mais ce n'est pas un renseignement de valeur absolue puisque je vous montre deux pièces où la couperose occupe le front qu'elle a considérablement épaissi. Cherchez alors la lèpre ; vous la trouverez aux lobules des oreilles et sur le corps. Ce que je vous ai dit de l'aspect lépreux suffit, d'ailleurs, à exciter vos craintes de la lèpre et à vous faire prendre une épingle.

Voici, enfin, un troisième diagnostic que vous aurez rarement à discuter, parce que l'affection n'existe pas chez nous,