

supérieure latérale gauche du cou, existe une tumeur du volume d'un œuf de poule, plutôt aplatie qu'ovoïde, à grand axe à peu près parallèle au bord du maxillaire inférieur. La tumeur n'est située ni dans la peau, ni dans le tissu cellulaire sous cutané. Elle est manifestement bridée par l'aponévrose cervicale superficielle et se prolonge en arrière au-dessous du bord du sterno-mastoïdien. Elle est mobile dans tous les sens sur une certaine étendue et l'examen le plus attentif ne permet pas de déceler des adhérences avec les organes voisins. Maintenant les tissus qui la recouvrent ont leurs caractères normaux. La peau a conservé sa coloration : elle ne présente aucune adhérence avec la tumeur, pas plus que le tissu cellulaire souscutané.

A la palpation, elle présente une consistance molle, semble fluctuante ; elle n'est pas réductible par la pression : les efforts de toux n'ont aucune influence sur elle, elle n'est animée ni de mouvements d'expansion, ni de battements.

Je vous ai dit en commençant qu'elle avait toujours été indolente et aujourd'hui elle n'est le siège d'aucune douleur soit spontanément, soit à la pression.

A quelle variété de néoplasme avons-nous affaire ?

Nous pouvons sans crainte d'abord éliminer tous les néoplasmes de consistance solide puisque la tumeur présente une consistance molle, voire même de la fluctuation, ce qui ici est un point délicat à trancher.

En supposant, avec assez de raison, que le contenu de cette tumeur soit liquide, nous devons nous demander quelle en est la nature, si c'est du sang, du pus ou de la sérosité.

Je crois que nous pouvons hardiment affirmer que ce n'est pas du sang. Cette tumeur siège bien à un endroit où existent de grosses branches artérielles et veineuses mais comme elle n'est animée d'aucuns battements, qu'elle est privée de mouvements