

tenue pendant 18 minutes avec 3 V ss de bromure d'éthyl. Médecins de l'hôpital présents.

3^o Pied-bot-double.—Patient âgé de 6 semaines. Anesthésie complète en 30 secondes; continuée pendant la division du fascia plantaire et des tibiaux postérieurs de chaque côté. L'enfant s'éveilla parfaitement et reprit connaissance moins de 4 secondes après qu'on eut fait cesser les inhalations. Dr Perrault, de St-Hyacinthe et médecins de l'hôpital, présents.

4^o Hon. M. O..., âgé de 55 ans. Pour examen de l'articulation du coude, 3 ii de bromure furent administrés; excitation considérable et lutte, l'anesthésique ayant été discontinué trop tôt. Deux autres drachmes produisirent anesthésie voulue et la connaissance revint presque aussitôt qu'on eut cessé l'anesthésique. Présent: Dr Brunelle.

5^o Amputation au-dessus de l'articulation du poignet.—Patient L. M., de Bélœil, âgé de 72 ans. Le Dr Perrault qui voulut bien se charger de l'anesthésie ne fut pas informé de l'agent qu'il employait et fut satisfait de ses effets. On n'a pas mesuré la quantité dans ce cas. Retour à la connaissance en enlevant la serviette.

6^o Talipes double, même cas que No 3, ci-dessus. Il s'agissait cette fois de diviser les deux tendons d'achille. L'anesthésique fut administré comme auparavant, mais on permit au petit patient de dormir après l'opération, comme on le conseille après le chloroforme ou les autres anesthésiques. Ces deux opérations ont été faites à Bélœil, en présence du Dr Perrault.

7^o Examen pour la pierre dans la vessie. Dans ce cas je passai l'anesthésique au Dr Finnie qui l'administra sans en connaître la nature. Je crois que le Dr F. en fut satisfait.

8^o Opération pour les hémorroïdes.—Femme âgée de 30 ans. La quantité employée fut peu considérable, moins de 3 iiss. L'anesthésie se produisit rapidement, et les hémorroïdes furent enlevées, mais avant le relâchement des sphincters de la vessie et de rectum. Malgré l'anesthésie complète que dénotait cet accident, l'intelligence revint aussitôt qu'on eut enlevé la serviette.

9^o Anesthésie pour l'enlèvement d'une partie du maxillaire inférieur chez un adulte.—L'opération fut longue et l'anesthésie fut maintenue pendant toute sa durée, le nez et une partie de la bouche restant couverts de la serviette pendant toute l'opération. L'intoxication continua longtemps après que l'opération fut terminée et le bromure discontinué; le patient se livrant à des démonstrations amicales. Plusieurs des médecins de l'hôpital étaient présents. Je crois inutile de mentionner d'autres cas analogues.