

Chamaeriphes. Dod. pempt. 820.

Chamaeriphes tricarpos spinosa, folio flabelliformi. Ponted. anth. 147. t. 8.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 1. p. 55.

Gewöhnliche Zwergpalme. W.

Habitat in Sicilia, agro Nicaeensi, Hispania, Lusitanis, Barbaria. Tr. (v. v.)

Datur duplex varietas caudice fere nullo et 20-pedali. W.

*2. *CHAMAEROPS ferrulata.*

C. frondibus palmatis, stipitibus aculeato-ferrulatis, caudice repente. W.

C. caule repente, stipitibus minutim aculeato-ferrulatis, drupis ovioides. *Mich. amer. 1. p. 206.*

Gefägte Zwergpalme. W.

Habitat in maritimis Georgiae, Floridae. Tr.

*3. *CHAMAEROPS Palmetto.*

C. frondibus palmatis, stipitibus inermibus, spathis duplicatis, caudice arboreo. W.

C. caule arboreo, stipitibus inermibus. *Mich. amer. 1. p. 206.*

Corypha (Palmetto) arborea, frondibus medio conniventibus, margine expansis. Walt. carol. 119.

Baumartige Zwergpalme. W.

Habitat in maritimis Carolinae, Floridae. Tr. (v. f. et v. v. f. fl.)

Spatha univalvis duplex. W.

*4. *CHAMAEROPS cochinchinensis. †*

C. frondibus palmatis, stipitibus spinosis, spathis partialibus, corollis monopetalis. *Loureiro cochin. 2. p. 808.*

Cochinchinensische Zwergpalme. W.

Habitat in sylvis Cochinchinae. Tr.

Palma caule 8-pedali, diametro pollicari, recto, aequali, nodis propinquis. Stipites longi tenues spinosi, spinis brevibus rectis sparsis. Frondes turbinatae pal-