

a été employé principalement par voie veineuse, à une dose représentant 0 gr. 21 ou 0 gr. 42 d'iode, 2 fois par jour pendant 20 jours. Les formes les plus douloureuses sont améliorées de préférence par le dérivé méthylé. L'amélioration est rapide: le sommeil reparait, le poids augmente cette augmentation a pu atteindre 21 kilogr. chez une femme traitée par la teinture d'iode, et les mouvements redeviennent possibles. Aucun phénomène toxique n'a été observé. L'expérimentation confirme l'innocuité de la méthode. L'iode doit donc occuper une place prédominante dans la thérapeutique du rhumatisme chr

P. L. MARIE.

Société Médicale des Hôpitaux,
(8 juin 1923).

TRAITEMENT AMBULATOIRE DES ULCÈRES VARIQUEUX.

Ce traitement, récemment préconisé par Okinczyc dans une communication à la Société de Chirurgie, est le traitement de Unna, dont la mise en œuvre est d'une extrême simplicité. On applique sur l'ulcère de la partie dite *l'ulcère de Unna*, en enveloppant la région malade de bandes de tarlatane imprégnées de pâte. Ces bandes sont laissées en place, suivant l'application de ce traitement l'ulcère est nettoyé, détergé, la pâte est déposée et préparée; alors seulement, on fait l'application méthodique de la pâte de Unna.

Voici la formule utilisée par Okinczyc :

de zinc.....	aa 20 grammes
zinc pure.....	
céarine	aa 80 grammes
au distillée.....	

Depuis le 28 mars 1922 jusqu'au 16 mars 1923, Okinczyc a traité cette méthode, à la consultation de l'Hôtel-Dieu, 86 ulcères variqueux. Cent malades n'ont pas été revus après le premier pansement, soit qu'ils aient changé de quartier, soit qu'ils n'aient pas voulu modifier la routine des pansements fréquents, soit enfin que l'ulcère, très petit, se soit cicatrisé dès cette première et unique application. Trente-six malades, encore en traitement sont pour la plupart en voie d'amélioration ou de guérison. Vingt malades sont complètement guéris et ne sont pas revenus depuis leur guérison, ce qui semble indiquer qu'il n'y a pas eu de récidive.