

un tampon de coton hydrophile trempé dans de la liqueur de Van Swieten et bien exprimé.

Dans les cas graves, nettoyer la muqueuse avec du coton hydrophile stérilisé pour enlever les plaques; la badigeonner ensuite une fois par jour au moyen d'un petit tampon monté sur une pince et imprégné de :

Niirate d'argent.....	1 gramme
Eau stérilisée ..	50 —

Neutraliser aussitôt avec un autre tampon trempé dans une solution de chlorure de sodium.

2° Laver fréquemment la cavité buccale, surtout avant la tétée, avec :

Borate de soude	10 grammes
Eau	100 grammes

ou

Eau de chaux.....	250 grammes
-------------------	-------------

ou

Bicarbonat de soude	} 44 5 grammes
Borate de soude.....	
Glycérine.....	} 44 25 grammes
Eau.....	

3° Nettoyage du mamelon ou de la tétine avant la tétée avec une solution de borate de soude à 10% et après la tétée avec de la liqueur de Van Swieten.

4° En cas de vomissements, faire tous les jours un lavage de l'estomac avec :

Birarbonat de soude.....	4 grammes
Eau bouillie.....	50 —

THERAPEUTIQUE

Traitement de la bronchite aigue, fébrile dans la première et la seconde enfance.

1° Faire appliquer matin et soir, pendant 10 à 15 minutes sur le thorax un grand cataplasme sinapisé. On fera suivre cette application d'une friction énergique sur le thorax avec un tampon de coton hydrophile ou un morceau de flanelle imprégnés de la mixture suivante :

Térébenthine.....	15 grammes
Alcool é 65°.....	300 —

2° Si l'enfant est couché, envelopper ses jambes de bottes de ouate et de taffetas gommé.