

composant leurs étuis de matériaux ligneux ou herbacés
5 espèces rencontrées.

Couleur fauve ;

Les 2 taches des ailes antérieures simplement hyalines.....1. **subguttatus**.

Les 2 taches des ailes antérieures argentées....2. **sublunatus**.

Couleur brune, légèrement jaunâtre ;

Ailes brunes-hyalines, guttulées de jaune-pâle à l'extrémité et au bord postérieur.....3. **pudicus**.

Ailes testacées, plus ou moins tachées de brun ;

Le bord antérieur avec les 2 taches presque immaculées.....4. **stipatus**.

Le bord antérieur avec les taches guttulées fortement de brun.....5. **plaga**.

1. Limnophile subguttulé. *Limnophilus subguttatus*, Walk.
—Long. .70 pouce; extension des ailes 1.20 pce. Fauve avec poils jaunes. Antennes fauves, annelées de brun, l'article basilaire poilu. Tête et prothorax, fauve, orange en dessus, le dernier avec une bande de poils jaunâtres de chaque côté. Pattes jaunes avec les épines noires et les éperons bruns. Ailes antérieures larges, tronquées obliquement à l'extrémité, d'un jaune d'ocre, le sommet, la base avec le bord postérieur, brun avec points pâles, le disque aussi obscurci de brun, avec la tache pâle du milieu et le thyridion, blanchâtres, sans être parfaitement hyalin; stigma brun foncé, entouré d'un cercle hyalin; ailes postérieures blanc-jaunâtre.—AC.

2. Limnophile subluné. *Limnophilus sublunatus*, Hag.—Long. .55 pce.; extension des ailes 1.10 pce. Fauve clair avec poils jaunâtres. Prothorax portant de chaque côté du milieu une strie soulevée chargée de fortes granulations. Pattes jaune-pâle, avec les épines noires et les éperons pâles. Ailes antérieures brun-jaunâtre, avec le bord costal, la tache du milieu, le thyridion et le bord postérieur d'un hyalin argenté, très apparent, le brun de l'extrémité portant quelques points pâles; stigma jaune avec une tache brune au milieu. Ailes inférieures sub-hyalines.—PC.

Le blanc argenté des ailes supérieures de cette espèce la fait distinguer à première vue.

3. Limnophile pudique. *Limnophilus pudicus*, Hag.—Long. .55 pce.; extension des ailes 1.00 pce. Brun cendré avec poils bruns. Antennes brunes, étroitement annelées de jaune-pâle. Pattes testacées avec les épines noires et les éperons pâles, les antérieures plus obscures,