

terne, ou dans les régions profondes du cou. L'opération est surtout indiquée, dans le cas de gonflement et d'œdème très étendus, afin d'éviter la compression des veines profondes et la gangrène. Elle doit consister en une incision profonde, parallèle à la branche de la mâchoire, et dirigée vers la partie postérieure de la glande, afin d'avoir moins de chance d'intéresser le nerf facial. La peau incisée, on débribe l'aponévrose avec le bistouri ou une soude cannelée, et on maintient la plaie ouverte à l'aide d'un tube à drainage. Puis, plusieurs fois, par jour, on pratique des injections dans ce tube, avec une solution phéniqué au centième. La plaie est recouverte d'un pansement antiseptique.—Relever les forces du malade, combattre l'adynamie, l'hyperthermie et la septicémie.—N. G.

(*L'Union Médicale* de Paris.)

Traitement de la méningite chez les enfants.

Franche, à forme phrénétique :

Deux à dix sangsues chez les enfants de 1 à 4 ans et saignée de (6 à 10 onces) chez les enfants plus âgés.—(CHARPENTIER.)

Deux sangsues sur les sutures crâniennes chez les tout jeunes enfants.—(CRUVELLIER.)

Deux sangsues aux apophyses mastoïdes remplacées par deux nouvelles, jusqu'à syncope.—(MAXWELL.)

Affusions froides sur la tête rasée.

Arrosage de la tête pendant 10 à 15 minutes avec de l'eau glacée.
(HEIN.)

Irrigation continuelle au moyen d'un seau d'eau suspendu sur le lit.
(PIET.)

Compresses imbibées d'eau froide ; ne pas suspendre les applications tant que durent les phénomènes phlegmasiques, mais les interrompre s'il survient coma ou faiblesses.—(RILLIET ET BARTHEZ.)

Si coma ou faiblesses :

Fumigations tièdes.—(ROMBERG.)

Cataplasmes tièdes.—(GUERSANT.)

Vésicatoire sur la tête.—(GUERSANT.)

Couronner avec le marteau de Mayor au niveau des fontanelles.
(MOULAUD.)

Huile croton tiglium XV à XX gouttes en frictions sur le cuir chevelu.—(R. ET B.)

Si les accidents phlegmasiques sont peu vigoureux au début :

Huile croton.....	11 (2) gouttes
Sucre pulv.....	2 dragmes