

Devant des jambes avec écailles rangées verticalement, 2 ou 3 seulement en bandes transversales.

1. Le Pluvier criard. *Aegialitis vociferus*, Cassin. *Charadrius torquatus*, Lin. *Oxyechus vociferus*, Reich.—Angl. *Kill deer*.—Longueur 9.50 ; ailes 6.50 ; queue 3.50 pouces. Bec noir ; bords des paupières rouges. Le sommet de la tête, le dos et le croupion bruns avec teinte verdâtre. Front avec une ligne au-dessus et au-dessous de l'œil blancs. Cou avec un large collier noir qui se répand en une bande de la même couleur sur la poitrine. Quelquefois toutes les plumes sont bordées de roux.

A. R.R.—Ce Pluvier appartient proprement au Sud et ne se montre que rarement sur nos grèves en automne. Il niche près des eaux, sur le sol ; pond 4 œufs couleur de crème, tachetés de brun et de pourpre.

2. Pluvier sémipalmé. *Aegialitis semipalmatus*, Bonelli ; *Tringa hiaticula*, Wils.—Vulg. *Pluvier à collier* ; Angl. *King Plover* ; *Semipalmated Plover*.—Longueur 7 pouces ; ailes 4.75 ; queue 2.25 pouces. Bec d'un jaune orange, terminé de noir ; pattes jaunes. Dessus d'un brun cendré avec teinte olive ; front, collier autour du cou et tout le dessous, blancs ; une bande noire à travers la poitrine remontant sur le dos, en arrière de l'anneau blanc. Pennes caudales du milieu d'un brun cendré olivâtre, avec une bande sub-terminale noire terminée de blanc ; les 2 extérieures blanches.

E. & CC.—Ce joli petit Pluvier se trouve sur nos grèves dès le mois d'Août où on le rencontre ordinairement en bandes considérables. Il niche sur les grèves, pond 4 œufs cendrés tachetés de brun. On le trouve souvent en compagnie de notre allouette des rivages.

3. Gen. SQUATAROLE. *Squatarola*, Cuvier.

Jambes avec 4 ou 6 écailles transversales en avant ; un doigt postérieur rudimentaire. 1ère rémige la plus longue. Queue légèrement arrondie.

Le Squatarole Suisse. *Squatarola helvetica*, Cuv. *Tringa squatarola*, Sim.—Vulg. *Vanneau Pluvier* ; Angl. *Black-Bellied Plover*.—Longueur 11.50 pouces ; ailes 7.50 ; queue 3 pouces. Bec et jambes noirs, forts ; ailes longues. Dessus blanc, presque pur et sans tache au front ; côtés du cou et croupion cendrés avec barres transversales brunâtres sur le dos, les scapulaires, et les couvertures alaires ;