

FORMULAIRE.

Eczéma.—*Dr Lassar.*

R.—Acid. salicylic.....	1 p.
Tinct. benzoini.....	2 p.
Ung. petrolei.....	50 p.

M.—En onctions, deux ou trois fois par jour.

Quand l'eczéma affecte une partie non reconverte de poils, l'auteur emploie la formule suivante :

R.—Acid. salicylic	2 p.
Ung. petrolei.....	50 p.
Zinci oxid.....	} aa 25 p.
Amyli	

M.—Même mode d'emploi que pour la pommade précédente.—*Philadelphia Med. Times.*

Eczéma de la face.—*Galezowski.*

R.—Huile de cade.....	} aa gr. v
Camphre	
Précipité rouge.....	gr. ii
Vaseline	ʒiii—M.

En onctions.

Acné.—*Bulkley.—Jackson.*

Dans l'acné de nature inflammatoire, Bulkley emploie la lotion suivante :

R.—Pulv. calaminæ præp.....	ʒss-i
Zinci oxid.....	ʒi-ii
Glycerini	ʒi-iiij
Aq. rosæ	ʒiv—M.

Dans l'acné indurata, Jackson préfère un onguent ainsi composé :

R.—Hydrarg. ammon	ʒi-ii
Hydrarg. chlorid. mit.....	ʒii-iv
Petrolati.....	ʒi—M.

—*N.-Y. Medical Journal.*

Hystérie.—*Dujardin-Beaumetz.*

R.—Pot. bromid.....	} aa ʒii ss
Sod. bromid	
Ammon. bromid.....	
Aquæ	ʒ

M. Sig.—De une cuillerée à thé à une cuillerée à soupe matin et soir.
—*Therapeutic Gazette.*