

supérieur. La grossesse guérit donc momentanément le prolapsus : elle agit de la même façon sur les hernies dont elle amène la réduction temporaire. Cependant le prolapsus peut persister pendant la grossesse, comme nous en avons un exemple.

Lorsque l'utérus gravide prolapsé n'est pas réduit, il se produit des phénomènes d'enclavement, de la rétention d'urine, de la constipation, quelquefois de la gangrène. L'accouchement a lieu prématurément, comme dans le cas actuel. Quelquefois, cependant, la grossesse peut aller jusqu'à son terme, mais c'est très rare, ce qui s'explique par le défaut de place. Il est exceptionnel de voir l'utérus en prolapsus complet, l'enfant étant ainsi porté en dehors de l'abdomen; l'utérus, dans ce cas, tombe jusqu'aux genoux et même plus bas. Cependant nous possédons quelques observations de ces cas singuliers, entre autres une de Fazzola. Dans ces circonstances, l'accouchement est long, difficile; il se produit de l'inflammation œdémateuse du col. Il peut se faire des déchirures utérines. Mais, comme dans le cas de Fazzola, la malade guérit; M. Tarnier est porté à croire que la déchirure était, non pas utérine, mais vaginale.

Que faire dans un cas semblable? Il faut mettre la malade au repos. On tentera ensuite de réduire l'utérus et, si on y arrive, on le maintiendra en place au moyen d'un pessaire ou d'un tampon. On a accusé ceux-ci de provoquer l'accouchement prématuré. Cependant bien des femmes qui portent des pessaires mènent leur grossesse à terme.—*Abeille médicale.*

Action pathogène d'un microbe trouvé dans les urines d'éclampsiques.—Le Dr. E. BLANC a fait, sur ce sujet, dans les *Archives de toxicologie*, une étude des plus intéressantes qu'il termine ainsi :

De ce qui précède il résulte qu'il existait dans les urines des éclampsiques examinées par nous, un microbe dont l'action pathogène se révéla à l'expérimentation par les effets suivants :

10. *Convulsions générales.* Chez les lapins ces convulsions sont suivies à bref délai de la mort de l'animal. La gravidité constitue pour elles une prédisposition manifeste.

20. *Tuméfaction inflammatoire intense au niveau des points inoculés.* Cette inflammation se produit chez les animaux qui ont résisté aux accidents généraux graves du début; elle est bientôt suivie de sphacèle. Après guérison de ces accidents les animaux jouissent vis-à-vis du même microbe d'une immunité assez grande, mais qui n'est pas absolue.

30. *Accidents divers d'ordre infectieux.* Abscès miliaires, phlébite, élévation de température.

40. *Déterminations rénales de gravité variable et albuminurie.*

Tranchées utérines.—Le Dr. RIVIÈRE publie, au sujet de leur traitement assez délicat, un long et intéressant mémoire dans la