

M.—À prendre 3 fois par jour, après les repas.—*Quarterly Compend. Med. Sc.*

Coliques saturnines.—*Bartholow.*

P.—Alun.....	2 drachmes.
Acide sulfurique dil	1 “
Sirop de citron.....	1 once
Eau	3 onces

M.—*Dose* : Une cuillerée à soupe toutes les heures ou 2 heures. L'alun serait l'agent le plus efficace pour combattre ces coliques.

Tonsillite.—*Solis-Cohen.*

P.—Teinture de gayac ammoniacale.....	ââ
Teinture de quinquina co.....	1 once
Chlorate de potasse.....	$\frac{1}{2}$ drachme
Miel.....	3 onces
Eau	1 chopine

M.—*Dose* : Une drachme toutes les deux heures, en gargarisme ; à l'intérieur, une drachme toutes les deux heures.

Diabète sucré.—*Burrows.*

P.—Carbonate d'ammoniaque	
Acide citrique.....	ââ 10 grains
Eau	1 once

M.—*Dose* : À prendre 3 fois par jour.—*Leonard's Med. Journal.*

Irrégularité cardiaque.—*Bowditch.*

P.—Poudre de digitale.....	10 grains
Poudre de colchique.....	20 “
Bicarbonate de soude.....	30 “

M.—Diviser en 20 poudres.

Dose : Une poudre 3 ou 4 fois par jour.—*Agit très bien.*

Antidote général.—

P.—Magnésie calcinée.....	} ââ p. æq.
Charbon de bois pulvérisé.....	
Peroxyde de fer hydraté	

M.—Dans de l'eau, constitue un antidote général, lorsque le poison est inconnu.—*Technics.*