Créosote de hêtre	1 drachme
Térébenthine du mélèze	15 grains
Acide benzoïque	Q. S.
Four 80 pilules.—10 par jour.	Bouchard).

## Huile:

(Bouchard).

Chaque cuillerée à soupe contient 0,75 de créosote, c'est une dose journalière que M. Bouchard dépasse souvent, il en donne alors deux ou trois cuillerées par jour.

Elixir:	
Créosote	1 drachme
Alcool	2 onces
Vin de Banyuls	12 onces
Sirop de sucre	4 onces
Une cuillerée à soupe matin e	et soir

(Dujardin-Beaumetz):

Les capsules de créosote constituent aussi un mode très pratique d'administration de la créosote ; on les donne pendant les repas.

Aux malades qui ont un estomac trop délicat, on peut prescrire la créosote par la voie rectale, soit en suppositoires, soit en lavements Mais le meilleur moyen est encore l'injection sous cutanée; elle est peut-être un peu douloureuse, mais elle agit bien et enlève toutes les appréhensions que peut faire naître l'emploi de la voie stomacale. Je crois que les "injections de créosote" doivent être faites avec une certaine précaution et qu'il est imprudent d'injecter de fortes doses à la fois ou de répéter trop souvent ce i injections. Ordinairement, j'injecte 0,50 tous les deux jours, rarement plus; je me tiens ainsi à l'abri des réactions inflammatoires, parfois si difficiles à arrêter, que provoque souvent la créosote à dose élevée.

Solution pour injections:			
Haile d'olives stérilisée	5	cent.	cubes.
Créosote de hêtre	0	gr. 60	cent.

Le lieu d'élection pour l'injection est la région du dos entre les épaules et la colonne vertébrale. Comme elle est assez doloureuse, on y ajoute quelquefois de la cocaïne, mais il faut se défier du cocaïnisme.

Huile d'olives stérilisée	8 cent. cubes.
Cocaïne	
Créosote de hêtre	1 gramme
	. (Josias).

Le Gaïacol, qui est un des éléments constitutiés de la créosote, et sans doute sons principe actif, est souvent employé maintenant et la remplace de plus en plus. Il a cet avantage d'être aussi actif qu'elle, à plus faible dose, et d'être moins irritant et moins congestif. Comme Picot, je l'ai souvent donné dans des cas de phtisie fébrile sans voir se produire la réaction