

A la partie supérieure du médiastin

ce sont : { la carotide et la jugulaire int.
le pneumogastrique.
le recurrent.

A la poitrine { *En avant* : Veine cave sup—crosse de l'aorte.
En arrière : Pneumogastrique et sympathique

groupe droit { *En haut* : Sous-clavier, récurrent.
En bas : Azygos et vaisseaux pulm.

groupe gauche. { *En haut* : Portion horizontale de l'aorte.
Récurent.
En bas : Art. et V. pulmonaires.

groupe inter-bronchique. { *En bas* : Veines pulm.
En arrière : Oesophage.
Azygos.
Aorte descendante.
Nerfs du plexus pulm.

Quelques ganglions superficiels situés au-dessus et en arrière de la clavicule ont aussi une importance assez grande puisqu'ils signalent la souffrance des ganglions profonds. C'est qu'ils font partie d'une chaîne largement anastomosée avec les ganglions profonds par l'intermédiaire du groupe sterno-claviculaire.

Ce groupe sterno-claviculaire est formé :

- 1^o Par le confluent de la chaîne ant. du cou.
- 2^o Par la chaîne mammaire int.
- 3^o Par les groupes trachéo-bronchiques.

Avec des rapports si intimes, au contact d'organes si importants dans le voisinage, on comprend que la symptomatologie peut présenter des tableaux assez variés, qui nous porteraient trop loin si on voulait en faire le détail, je me bornerai à une énumération aussi simple que possible.