

Naphtol B. .... }  
 Salicylate de magnésie..... } aa 2 grammes 50

à diviser en 10 paquets, un toutes les heures.

Les résultats obtenus ont été très favorables, on peut les résumer ainsi :

Diminution et désinfection des selles, diminution ou suppression du météorisme intestinal, amélioration de l'état buccal.

Atténuation des accidents nerveux, diminution de l'albuminurie, abréviation de la convalescence qui en général évolue sans complication.—*Nice médical.*

## SYPHILICRAPHIE

**Diagnostic du chancre syphilitique.** Clinique de M. le prof. FOURNIER, à l'hôpital Saint-Louis.—Le diagnostic du chancre syphilitique présente deux ordres de difficultés. D'une part nous avons les difficultés de diagnostic que chacun sait avec le chancre mou, avec l'herpès, etc., d'autre part, et c'est là ce qui nous occupera aujourd'hui, on peut se trouver en face de difficultés auxquelles on ne songe nullement d'ordinaire. Nous allons nous occuper : 1° des indurations factices ; 2° des nodosités blennorrhagiques ; 3° de l'ecthyma scabieux.

C'est M. Ricord qui a bien fait connaître la nature des indurations factices. Ces infiltrations de tissu absolument rondes, à base rénitente, simulent bien l'induration du chancre syphilitique. Quoique ces infiltrations de tissu puissent prendre naissance spontanément, elles sont ordinairement causées par l'application de topiques médicamenteux quelconques, d'un caustique.

Si, par exemple, on cautérise aujourd'hui une érosion herpétique avec du nitrate d'argent, le lendemain cette petite érosion présente une base absolument indurée impossible à différencier de la base indurée d'un chancre syphilitique. Le vitriol, l'acide phénique, l'acide acétique, l'acide chromique, etc., sont capables de déterminer cette induration.

M. Fournier fabrique de toutes pièces en quarante-huit heures un chancre induré. Une goutte de nitrate acide de mercure, placée dans la rainure glando-préputiale, donne au bout de ce temps une ulcération qui est la reproduction exacte du chancre syphilitique. M. Fournier rappelle à ce propos une femme venue à l'hôpital l'année dernière. Elle présentait à la lèvre inférieure une érosion ayant absolument l'apparence d'un chancre induré. Elle l'avait tout simplement provoqué en cautérisant une gerçure qu'elle avait à cette lèvre avec de l'acide azotique étendu d'eau.

A la longue liste des caustiques on peut ajouter encore le tannin, l'alcool, l'alun, qui produisent ce même résultat. On peut en dire également autant du vinaigre de Bully, de l'eau de Lubin, de l'eau de Cologne, de l'alcool camphré, de l'eau blanche,