

Ferre expérimentale de Lacombe, Alberta.

être à intervalles d'environ 4 à 5 pouces dans les rangs. Le semis a eu lieu le 29 mai, et l'arrachage des racines le 22 octobre.

Numéro.	Variétés essayées.	Produit en 1907.		Numéro.	Variétés essayées.	Produit en 1907.	
		ton.	lb.			ton.	lb.
	(Un an.)				(Un an.)		
1	Improved Short White	26	744	4	Half Long Chantenay	14	1,568
2	Ontario Champion	16	680	5	White Belgian	14	982
3	Giant White Vosges	16	680	6	Mamm. White Intermediate	12	222

Le rendement moyen des six variétés de carottes à la ferme expérimentale de Lacombe en 1907 a été 16 tonnes 1,479 lb. par acre.

BETTERAVES À SUCRE.

Il a été essayé à Lacombe en 1907 trois variétés de betteraves à sucre. Elles ont été semées à rayons espacés de deux pieds, et les jeunes plantes ont été éclaircies de manière à être à intervalles d'environ 4 à 5 pouces dans les rangs. Le semis a eu lieu le 24 mai, et l'arrachage des racines le 21 octobre.

Numéro.	Variétés essayées.	Produit en 1907.		Numéro.	Variétés essayées.	Produit en 1907.	
		ton.	lb.			ton.	lb.
	(Un an.)				(Un an.)		
1	Wanzleben	18	960	3	Vilmorin améliorée	15	1,152
2	Très riche française	15	1,680				

Le rendement moyen des trois variétés de betteraves à sucre à la ferme expérimentale de Lacombe en 1907 a été 16 tonnes 1,264 lb. par acre.

POMMES DE TERRE.

Il a été cultivé à Lacombe en 1907 quatorze variétés de pommes de terre. Pour le plantage les tubercules ont été coupés en tronçons à deux ou trois yeux, et ceux-ci ont été plantés en rangs espacés de deux pieds et demi, les plantons à intervalles d'environ un pied dans les rangs. Le plantage a eu lieu le 15 juin, et l'arrachage le 10 octobre.