

le traitement étant le même pour toutes les entorses, nous traiterons spécialement de celle-ci.

CAUSES.—Les coups, glissades et chutes.

SYMPTOMES.—Boiterie plus ou moins intense suivant la gravité. En palpant l'on constate de la douleur aux articulations. Il y a généralement gonflement. Si l'entorse est d'une certaine gravité, l'animal se porte peu sur le membre malade, il se tient le boulet à demi fléchi ; et lorsque le cheval est en marche il y a manque de fermeté de la pose du pied sur le sol.

TRAITEMENT.—L'application prolongée de bandages mouillés à l'eau froide donne, au début, des résultats satisfaisants. Mais après 2 ou 3 jours, si l'on ne peut se procurer un bandage plâtré, le remplacer par un bandage à l'empois euit, et le laisser en permanence pendant 15 à 20 jours ou plus. Après ce temps, s'il n'y a pas amélioration, suivre la prescription suivante :

R. Onguent cantharide 1 dans 4 de saindoux—2 onces. Friktionner une seule fois le boulet pendant 5 minutes après avoir rasé le poil.

Dans toutes ces maladies le repos absolu est de rigueur et des reins, employer le même onguent.

Dans toutes ces maladies le repos absolu est de rigueur pendant le traitement.