

FORMULAIRE.

Bronchite aiguë.—(*Prof. J. Pancoast.*)

R—Prun. virg. cort; senegæ rad.....	â.â. ʒiv
Ipecac rad.....	ʒii
Ext. conii.....	gr. xv
Aque, q. s. ad.....	ʒviii
Opérez par déplacement, puis ajoutez :	
Spt. genevæ.....	ʒi
Tr. cardam. co.....	ʒi

M.—Dose : Deux cuillerées à thé dans de l'eau, à chaque quinte de toux.—(*Medical Bulletin.*)

Pneumonie infantile.—(*Dr B. Brown.*)

R—Spirit. vini.....	ʒi
Aque.....	ʒii
Acid. carbolici.....	ʒss
Sodii bicarb.....	ʒi
Acid. salicylici.....	ʒi
Chloral. hydrat.....	ʒss

M.—En inhalations trois fois par jour ou davantage.—(*Texas Med. & Surg. Rec.*)

Asthme.

R—Tinct. lobeliæ.....	ʒv
Ammonii iodid.....	ʒii
Ammon. brom.....	ʒiii
Syr. toluatan.....	ʒiii

M.—Une cuillerée à thé répétée à intervalles de une, deux, trois ou quatre heures.

Le malade est soulagé en quelques minutes et quelquefois le bon effet est permanent.—(*Fothergill in Amer. Med. Journ.*)

Dysenterie chronique.—(*W. K. Bowling.*)

R—Ipecac.....	gr. xxiv
Acid. carbolici.....	gr. vii
Gum. opii.....	gr. vi

M.—Fiant pilulæ n° 12.—Dose : Une toutes les 4 heures p. r. n. (*Southern, Pract.*)

Névralgie.—(*Bartholow.*)

R—Chloroformi.....	} â.â p. aeq.
Camphoræ.....	
Chloral. hydrat.....	

M.—Usage local.—(*Med. Bulletin.*)