

tour la fièvre typhoïde et la syphilis, le Dr Larin a trouvé à l'examen du sang : globules rouges, 3,500.030 ; globules blancs, 42,000 ; hémoglobine, 6 0/0. Bien que la proportion des globules blancs ne soient pas très considérable, il croit à l'existence de la leucocythémie. Pour fixer le diagnostic davantage le bébé sera soumis à un traitement spécifique pendant trois mois.

M. BENOIT croit que l'on est ici en présence de la réaction du système lymphatique à la suite de l'infection intestinale chez un bébé qui a fortement une apparence scrofuleuse.

M. DUBÉ croit au contraire, s'appuyant sur le fait que M. Larin a constaté un bon nombre d'éosinophiles parmi les globules blancs du sang, à l'existence d'une pseudo-leucocythémie.

#### *Présentation de pièces pathologiques.*

M. DUBÉ présente des pièces anatomiques provenant d'un homme de 50 ans mort à l'Hôtel-Dieu de néphrite ascendante. Les reins sont petits, la prostate hypertrophiée, la vessie très épaisse. M. Dubé attribue l'origine de cette inflammation chronique à la gonorrhée.

M. DUBÉ présente en outre des pièces provenant d'une femme de 60 ans morte à l'Hôtel-Dieu. La plupart des organes présentent les caractères particuliers à la dégénérescence de la vieillesse. Les reins sont gros, durs et congestionnés. La mort a été subite, par suite, pense M. Dubé, des lésions rénales.

M. MERCIER, prenant en considération l'âge du premier malade de M. Dubé, ainsi que l'hypertrophie de la prostate, s'explique très bien l'hypertrophie vésicale.

#### *Rapport de cas.*

#### **NOTE SUR UN CAS DE TUMEUR INTRA-OCULAIRE.**

M. FOUCHER.

M C..., âgé de 70 ans, est entré à l'Hôpital Notre-Dame le 22 novembre dernier, réclamant des soins pour une tuméfaction volumineuse dans la région de l'œil droit. L'œil lui-même n'est pas visible, les paupières sont entre-ouvertes, refoulées et tendues en avant, de telle sorte qu'il est impossible de leur faire exécuter aucun mouvement. Dans l'entre-baillement des paupières, on aperçoit une tumeur dure, élastique, de coloration rouge. Le patient raconte qu'il y a cinq ans, il était à bucher un arbre lorsqu'une branche de la grosseur d'un manche de pipe et d'une longueur de trois pieds environ est venue lui frapper l'œil droit. On constata chez lui une rougeur à l'angle externe et une ecchymose palpébrale. Éloigné des médecins, il fit des applications froides ; la douleur se calma graduellement, la vision demeura bonne pendant 2½ ans, mais il persista de la rougeur à l'angle externe de l'œil et du larmement sous l'influence de causes irritantes. Des douleurs fugaces furent aussi éprouvées de temps à autre. L'œil sain n'éprouva aucun symptôme en rapport avec ce traumatisme.