

malade se présente à la consultation pour des troubles d'estomac, de poumon, de nutrition ou autres et que l'on constate un dédoublement du second bruit, il est toujours assez facile de voir s'il existe une balanite, une orchite, un phimosis ou un paraphimosis qui en serait la cause; mais il est beaucoup plus difficile de connaître toute la vérité concernant les habitudes du malade qui hésite à répondre aux questions d'une nature très intime. Un supérieur de collège a même fait remarquer à un confrère traitant les jeunes élèves, qu'il ne devait pas enseigner le mal en faisant à ses patients des questions indiscrettes pour chercher la cause des affections constatées et que l'examen des organes génitaux ne devait se faire qu'après la permission des parents. Rassembler des matériaux pour la construction d'un édifice scientifique n'est donc pas une tâche facile. Parmi les 66 cas observés nous avons pu établir que chez 35 l'origine du trouble cardiaque était dû à la masturbation quotidienne ou bi-hebdomadaire. Chez 15 garçons nous avons constaté un état de phimosis accompagné d'irritation douloureuse et deux cas de paraphimosis avec balanite. Les 14 jeunes filles qui présentaient un dédoublement du second bruit du cœur étaient des nymphomanes qui désiraient un traitement contre les palpitations du cœur et la dyspepsie.

Les malades souffrant de phimosis furent opérés avec succès sous l'influence du chloroforme. Les deux opérés à la cocaïne pour paraphimosis, l'un âgé de 20 ans et l'autre de 38 ans, refusèrent l'anesthésie générale parce que leur médecin leur avait dit que le cœur n'était pas dans la condition normale. Dix malades guéris de leur phimosis et revus 3 à 4 mois après l'intervention ne laissaient plus entendre un dédoublement du second bruit. Les deux patients opérés pour paraphimosis ne présentaient plus de dédoublement deux mois après la guérison.

L'observation de personnes qui se font traiter pour des troubles subjectifs n'est pas facile à recueillir d'une manière complète, car elles ne se présentent à la consultation qu'à de longs intervalles. Huit cas d'onanisme qui avaient cessé leurs habitudes à l'aide du traitement moral et du bromure de potassium, administré matin et soir, 3 fois par semaine, durant un mois, furent examinés six mois après et ne présentaient plus rien d'anormal au cœur. Quelques-uns avaient augmenté en stature et en poids de 7 à 15 livres. Chez deux jeunes malades le dé-