sang suivant la taille et le volume du cheval. Puis on attendra les secours médicaux du patricien diplômé qui aura été requis.

Il faut user des mêmes soins quand le coup de sang est accompli, c'est à-dire quand il y a chute du malade.

La pression des veines du cou par un collier mal fait ou trop étroit, l'exposition directe et souvent abusive des animaux aux rayons solaires, les courses exagérées et la précipitation dans l'exécution des travaux, surtout pendant les chaleurs, telles sont les causes déterminantes du coup de sang. Elles sont faciles à éviter; il suffit d'un peu de bon vouloir.

Quelquefois, il y a coup de sang à la moelle épinière. L'apoplexie de cet organe s'annonce par l'affaissement soudain de la croupe, les membres de derrière s'appuyant sur la face antérieure des boulets fortement fléchis; la chute du malade et la paralysie plus ou moins complète des membres suivent ordinairement de très-près l'apparition de ces premiers signes.

Les douches d'eau très-froides appliquées sans relâche sur les reins et la croupe sont les premiers et meilleurs remèdes à opposer avant l'arrivée d'autres secours médicaux. Si ceux-ci se faisaient trop attendre, on pourrait amputer un bout de la queue, afin d'opérer une évacuation sanguine presque directe et souvent salutaire. On laissera l'animal à la diète, couché sur une bonne et épaisse litière, et l'on passera quelques lavements simples.

TÉTANOS OU MAL DE CERF.

De toutes les maladies qui peuvent atteindre nos animaux, le tétanos est à coup sûr l'une des plus graves, en même temps que l'une des plus faciles à distinguer, à telle enseigne que toute personne, même étrangère à l'art vétérinaire, qui a vu une fois un cheval tétanique, ne saurait plus méconnaître le mal, à moins d'être complètement dépourvue d'esprit d'observation. Le premier symptôme qui attire ordinairement l'attention est une certaine raideur dans l'encolure, co-existant dans la généralité des cas avec une difficulté évidente de manger et une production abondante de salive, laquelle s'écoule filante hors de la bouche.