

de la 1ère cubitale et une autre à la réception de la 1ère récurrente.

♂—Antennes longues et grêles. — Ottawa (Harrington).

19. Némate à-abdomen rouge *Nematus erythrogaster*, Nort. Trans. Am. Ent. Soc. I, 205.

♀—Long. .28 pcc. Noir; antennes médiocrement longues, brunâtres en dessous, à articles non renflés à l'extrémité. Tête rugueuse sur le vertex, avec les ocelles dans des petites fosses, le chaperon échanuré, son bord antérieur avec le labre, jaune-pâle. Les écailles avec les angles antérieurs, jaune-roussâtre. Ailes hyalines, le stigma brun, pâle à la base, le costa aussi pâle. Pattes variées, les hanches, les trochanters avec une bande à la base des jambes, blanc; les 4 cuisses postérieures avec l'extrémité des jambes intermédiaires, roux-pâle; le sommet des cuisses et des jambes postérieures avec leurs tarses, noir. Abdomen roux clair, avec les 2 segments basilaires noirs. Les segments roux avec une petite bande brune de chaque côté du milieu.—Ottawa (Harrington).

Espèce bien reconnaissable par sa coloration.

20. Némate militaire. *Nematus militaris*. Cres. Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 7.

♀—Long. .26 pcc. Noir, antennes plus de la moitié du corps en longueur, grêles, particulièrement à l'extrémité. La bouche noire, les palpes, les côtés du prothorax, les lobes latéraux du mésothorax, les écailles, les flancs excepté une étroite bande au-dessous des ailes, la poitrine, les pattes excepté la moitié apicale des jambes postérieures avec leurs tarses, roux-pâle. Ailes hyalines, le stigma noir, la 3e cubitale peu plus grande que la 1ère, la 2e recevant chacune des 2 récurrentes à même distance de chacune de ses extrémités. Abdomen allongé, brillant, le ventre roux-testacé, plus ou moins varié de brun—Ottawa (Harrington).

Ses épaules rousses le rendent bien reconnaissable.