

TOXICOLOGIE.

EMPOISONNEMENT PAR LE LAUDANUM.—INJECTIONS HYPODERMIQUES D'ATROPINE.—GUÉRISON.—Une jeune femme avale d'un trait une once et demie de laudanum (42cc51). Peu après le Dr. Schell constate une narcose profonde avec pouls insensible et une respiration très-affaiblie. Vainement on essaye d'un vomitif et de la teinture de belladone ; il faut recourir à la respiration artificielle et à l'injection hypodermique de sulfate d'atropine (1/48 de grain, soit 0gr,0012). Bientôt le pouls est plus appréciable (178), la respiration plus forte et les pupilles se dilatent ; puis il survient des vomissements. Les symptômes alarmants reparaissent à nouveau, on pratique, au bout de vingt minutes, une nouvelle injection de sulfate d'atropine, et une troisième, une demi-heure après. Chaque fois l'amélioration suivit et il y eut des vomissements. Cet effet émétique, dit l'auteur, est assez extraordinaire, provoqué par l'atropine, alors qu'on ne l'avait pas obtenu du tartre stibié. Il n'est pas cependant exceptionnel, car il a été vu, dans des cas analogues, par MM. Gee et Walker.

Egalement l'atropine eut le meilleur effet sur la respiration, elle la rétablit beaucoup mieux que les tentatives de respiration artificielle.

Finalement, la malade guérit très-bien. L'auteur ajoute que, naturellement, on ne doit jamais employer que les doses faibles d'atropine.—*Med. Times. (Bordeaux Médical.)*

—:—

HYGIENE.

ALIMENTATION DES PETITS ENFANTS.—Le docteur Abraham Jacobi (*New-York Medical Record*) donne les règles suivantes à cet égard. Pour les enfants à la mamelle, les nourrir outre mesure est ce qu'on peut faire de plus nuisible ; un enfant de un ou deux mois doit teter toutes les deux ou trois heures ; s'il a six mois au plus, cinq fois dans les vingt-quatre heures et pas davantage. S'il a soif dans l'intervalle, donnez-lui à boire de l'eau, ou de l'eau d'orge, mais non sucrée. Pour les enfants qui ne sont pas allaités, faites bouillir une cuillerée à thé d'orge moulu (dans un moule à café) dans un décilitre d'eau pendant un quart d'heure ; ajoutez un peu de sel, filtrez et mélangez avec parties égales de lait bouilli additionné d'un peu de sucre. Faites boire tiède dans un biberon ; augmentez la proportion du lait pour les enfants qui ont plus de six mois. Quand les enfants sont très-constipés, au lieu d'orge on emploie l'avoine, qui doit être cuite et moulu. Pendant les chaleurs fortes, il faut s'assurer de l'état de cette boisson avec du papier de tournesol, et si celui-ci rougit, en faire de nouvelle, ou l'additionner d'une pincée de bicar-