

Nous ne sommes arrivés à cette technique qu'après de longs tâtonnements *et nous croyons pouvoir la recommander* parce que nous connaissons les autres méthodes et que nous avons pu faire la comparaison.

La douleur qui suit assez souvent l'injection constitue évidemment le côté désagréable de la nouvelle méthode. La technique est ici très importante.

Jusqu'ici nous évitons de dénaturer le produit par l'adjonction de solution de soude ou d'anesthésique. Mais, à l'encontre des auteurs allemands, nous injectons la solution beaucoup plus concentrée et à la dose de 3 à 4 cent. cubes pour chaque fosse iliaque. D'après notre expérience personnelle, nous constatons que notre technique n'est nullement plus douloureuse que celle utilisée en Allemagne, *d'autant plus que les doses que nous injectons sont presque doubles* de celles employées par Wechsellmann.

Les injections intra-veineuses ne sont pas douloureuses à la dose de 0,50 centig. et sont très bien supportées. A la dose de 0,80 ou 1 gramme, que nous avons injectée trois fois, le tableau est un peu différent. A la suite d'une injection de 30 c.c. d'une solution contenant 1 gramme de Hata chez des sujets jeunes et bien portants, la face devint d'abord vultueuse, puis pâle, un sentiment profond d'angoisse saisit subitement le patient; une douleur gastrique se déclare et bientôt surviennent quelques vomissements. Les accidents durent une dizaine de minutes, et nous tenons à justifier cette dose massive intra-sanguine par les considérations résultant des doses injectées d'abord aux animaux.

La dose de 1 gr. peut être injectée dans les veines chez un individu jeune et sain, *ne présentant aucune tare*. Les malades qui ont reçu ces doses massives ont eu de la diarrhée pendant 24 heures, une première nuit d'insomnie, mais tous les trois se présentaient le lendemain à la clinique. L'appétit est affaibli pendant deux ou trois jours, puis tout rentre dans l'ordre.

L'expérience établit si les résultats de ces doses massives injectées dans les veines sont supérieurs à ceux des injections intramusculaires et justifient les quelques inconvénients et les émotions qu'elles donnent. La dose de 1 gr. est certainement une limite au delà de laquelle il ne faut pas aller en injections intra-veineuses. Nous conseillons cependant d'attendre de nouvelles expériences avant de dépasser 0,80 cgt. en injection directe dans