

avant d'atteindre la caudale. Mâchoire inférieure plus longue. Point de vessie natatoire.

Ces poissons ont bien la tête des Anguilles, mais la partie inférieure du corps n'est pas si complètement serpentiforme que chez celles-ci. Une seule espèce.

**Ammodyte d'Amérique.** *Ammodytes Americanus*, Dekay; *A. tobianus*, Bloch; *A. lancea*, Ayres.—Vulg. *Anguille de roche*; Angl. *Sand-Eel*. Fig. 17.—Long. 6 à 12 pouces. D'un brun verdâtre sur




Fig. 17.

le dos; les côtés et le ventre argentés; dessus de la tête rougeâtre, opercules cuivreux et argentés. Pupilles noires; iris argentées. Corps légèrement comprimé. Tête à museau pointu. Ligne latérale droite et dentée. Nageoire dorsale un peu plus haute au delà de son milieu, non unie à la caudale, reçue dans un sillon à sa base, lorsqu'elle n'est pas étendue. Les pectorales ont une petite membrane s'étendant de leur bord postérieure sur les côtés de l'abdomen. Anale à peu près le tiers de la longueur du corps et se terminant comme la dorsale sans toucher la caudale; celle-ci fourchue.

Formule ptérygiale: D. 61; P. 13; A. 28; C. 14.

Ce poisson, qui ne se trouve qu'à l'eau salée, est quelquefois rejeté sur le rivage en immense quantité dans les tempêtes. On le sert souvent sur les tables, et il est la proie ordinaire d'une foule d'ennemis, parmi lesquels les Encornets figurent au premier rang.

Fig. 17—*Ammodytes Americanus*, Dekay.