a. Diarrhée.—Il est très difficile, en étudiant les auteurs français, de se faire une idée nette sur la diarrhée des enfants. Il y a pourtant deux espèces bien distinctes de diarrhée; la diarrhée ou l'athrepsie, qui résulte d'une nourriture insuffisante ou de mauvaise qualité, et la diarrhée épidémique, ce que les Anglais appellent la *diarrhée d'été*. C'est cette diarrhée épidémique, qui peut se développer toute l'année, mais qui sévit bien plus pendant la saison chaude, que l'on attribue le plus souvent aux dents. "Lorsqu'il pousse des dents aux enfants, disent les parents, ça leur change le corps." Mais si l'on fait attention, on verra que le corps des petits voisins, qu'ils fassent des dents ou non, est également changé.

b. Toux.—Deux maladies produisent principalement la toux chez les enfants: la pneumonie, maladie épidémique, quelquefois difficile à diagnostiquer, surtout lorsqu'on n'a pas l'habitude des enfants, et la bronchite. Or la bronchite, qu'on l'attribue à telle ou telle cause, est bien plus épidémique encore que la pneumonie. Lorsqu'il y a un rhume dans un pays, il y en a beaucoup. Et cependant, chaque fois qu'un enfant tousse, les parents commencent par dire: "Ce sont les dents." Mais si l'on cherche dans la maison, on trouve presque toujours un enrhumé, le père, la mère, un frère ou une sœur; et si l'on dit à la mère: "Mais vous toussiez aussi, ce sont probablement les dents", elle ne sera pas davantage persuadée, tant est ancré le préjugé.

c. Feux de dents.—On appelle feux de dents des éruptions cutanées, siégeant à la face, aux paupières ou sur le crâne. Ces éruptions sont, ou bien des croûtes d'impétigo, ou bien des vésicules non développées de la même affection. Et comme l'impétigo, ainsi que M. Chaumier l'a soutenu à Blois l'an dernier (1), est une manifestation d'une maladie épidémique, contagieuse, inoculable, on pourra se donner la satisfaction de chercher dans l'entourage de l'enfant celui qui l'a contagionné.

d. Fièvres.—La fièvre de dentition, tel est encore un des accidents décrits par les auteurs. Or un enfant a la fièvre pour bien des raisons et il est vraiment trop facile de dire: "Ce sont les dents." Quand un enfant a la fièvre, il faut en chercher la cause. Un certain nombre de maladies passent inaperçues chez les jeunes enfants si on ne les cherche pas. L'auteur a déjà parlé de la pneumonie. Des maladies plus fréquentes encore que la pneumonie et qui peuvent être facilement méconnues, ce sont les angines. Sans parler de l'angine diphthéritique, il y a deux sortes d'angines également épidémiques, c'est-à-dire que l'on rencontre en même temps sur un certain nombre de sujets: l'angine dite érythémateuse, ou angine simple, et une autre qui a été confondue jusqu'ici par presque tous les auteurs avec cette dernière, et que M. Chaumier appelle *fièvre amygdalienne*, parce que l'état fébrile domine les autres symptômes. La maladie débute tout d'un coup, comme la pneumonie, par une fièvre vive, souvent des vomissements, et l'on peut être dérouté par cet état général, grave en apparence, et ne pas voir qu'il y a une légère injection des amygdales, avec ou sans sécrétion blanche, surtout ne pas s'apercevoir que derrière la branche montante du maxillaire l'amygdale immobile est augmentée de volume.

En dehors de ces maladies, on rencontre également chez l'enfant, mais pas plus fréquemment que chez l'adulte, ces affections indé-

(1) Voir la *Gazette des hôpitaux*, 1884, p. 965.