

Le patient peut aussi se servir d'une seringue de la capacité d'un once pour injection dans le vagin et alors appliquer une éponge imbibée de glyco-thymoline qui doit être renouvelé après 24 heures.

Le traitement utérin-nitrano exige cependant un médecin expérimenté. D'abord, dilation de la matrice avec soin, ensuite aseptique parfaite et instruments stérilisés ; enfin, introduction du tempon gauze ou aptre moyen d'un spéculum utérin et d'un traitempon gauze ou aptre moyen d'un spéculum utérin et d'un instrument mousse. Il faut alors remplir la cavité utérine lentement et par mouvements de rotation, puis avec une seringue à long tube, saturer cette gauze ou tempon d'une solution concentrée de glyco-thymoline qui s'absorbe facilement et imbibe complètement le tempon qui doit être renouvelé toutes les 24 à 48 heures, de une à 4 fois par semaine suivant le besoin. Le tempon d'éponge est inséré après l'ablation du pactage utérin.

Ce traitement est nul doute supérieur à tout autre en usage voir même aux injections intra-utérines d'iode, d'acide pyrogallique, carbolique, aux cauterisations de nitrate d'argent, etc.

ARMES ROYALES

Par permission spéciale fournisseurs de Sa Majesté Edouard VII.

"BOVRIL"

Préparation garantie et pure de bœuf de première qualité.

Pour nous assurer une quantité suffisante d'animaux de premier ordre, et satisfaire nos clients, nous avons acheté 926,400 arpents de terre en pâturage dans le territoire nord-ouest du Sud et de l'Est de l'Australie et 438,076 arpents de terre dans la République Argentine. Nous possédons maintenant 200,000 bêtes à cornes dans ces prairies, et nous avons l'intention d'en augmenter le nombre considérablement.

Nos terrains représentent une superficie de plus de la moitié de la Nouvelle-Ecosse.

BOVRIL LTD.,
27, rue St-Pierre, Montréal.
