

Ici comme dans la plupart des observations publiées, l'opération n'a eu qu'un effet palliatif et temporaire.

De l'occlusion intestinale et de son traitement.

Par le Dr S. BOLDUC,

St-Michel, Bellechasse.

Les symptômes caractéristiques de l'occlusion intestinale sont : la douleur, le vomissement et l'arrêt des évacuations alvines.

Les causes de cet état morbide sont nombreuses et tellement différentes les unes des autres, que certains auteurs ont cru devoir décrire plusieurs variétés de la maladie.

Il est assez facile, généralement, d'établir qu'il y a occlusion de l'intestin; mais le plus souvent, on ne peut reconnaître ni le siège, ni la nature de la lésion qui a déterminé l'accident.

Voilà pourquoi quand on se trouve en présence d'un cas dont la cause pathogénique n'est pas connue et que le traitement est devenue d'urgence, il faut éviter l'emploi de moyens qui pourraient, dans certaines variétés d'occlusion, aggraver le mal, au lieu de le faire cesser.

On sait, par exemple, que l'action principale de la plupart des purgatifs, aussi bien que de l'électricité, consiste dans l'excitation de la contractilité musculaire; on sait également que dans l'invagination, l'étranglement interne, le volvulus, et dans certaines occlusions spasmodiques ou inflammatoires, la contractilité musculaire de l'intestin est augmentée, exagérée; on sait, de plus, que dans la maladie qui nous occupe, un symptôme caractéristique, l'altération des traits du malade, provient surtout de l'excitation des nerfs de l'intestin: on conçoit alors tout le tort que peuvent faire les purgatifs et l'électricité.

Les purgatifs! Qui les a employés avec succès dans l'occlusion intestinale aiguë? Admettons, toutefois, que, dans la pratique, ils fassent peu de mal, attendu que, le plus souvent, ils ne sont pas absorbés à cause de l'état particulier dans laquelle se trouvent les organes de la digestion, et qu'ils finissent par être rejetés par le vomissement.

Quant à l'électricité, je comprends qu'elle a pu avoir quelques bons résultats dans des cas de parésie ou de dilatation de l'intestin; mais quand on vient nous conseiller de nous adresser à l'électrothérapie dans toute