

touffe de longs poils blancs, le vertex presque nu. Ailes hyalines, légèrement obscures à l'extrémité, le stigma jaune, la 2e cellule orbitale fortement rétrécie vers la radiale. Pattes noires avec longs poils blancs, peu abondants. Abdomen ovale-elliptique, assez convexe chaque segment avec une bande brun-roussâtre au sommet munie de poils blanchâtres, les poils de l'extrémité aussi blanchâtres.—PC.

Se distingue facilement des autres espèces par sa villosité.

**7. Andrène placide.** *Andrena placida*, Smith, Cat. B. Mus. 1. p. 112, ♀.

♀—Long. .40 pce. Noire; la face avec une pubescence blanchâtre peu dense; les antennes ferrugineuses en dessous à l'extrémité. Le thorax couvert d'une pubescence ochracée-pâle peu dense. Ailes sub-hyalines, les nervures ferrugineuses-pâles, les écailles testacées-roussâtres. La pubescence des pattes blanchâtre en dessous, jaunero-roussâtre en dessus; les tarsees fauves en dessous, leurs articles terminaux ferrugineux. Abdomen oval oblong, poli, brillant, segments 2, 3 et 4 avec une frange argentée étroite, plus étendue sur les côtés, la frange du segment anal brune. En dessous les segments ont une étroite frange blanchâtre.

Capturé à Montréal au CapRouge etc.

**8. Andrène glacée.** *Andrena algida*, Smith, Cat. B. Mus. 1, 116.

♀—Long. .40 pce. Noire; à pubescence grisâtre, légèrement ochracée sur le thorax. Mésothorax avec fortes punctuations peu denses, encore plus fortes sur l'écusson; métathorax rugueux par des stries longitudinales. Pattes à pubescence blanche, légèrement obscures au sommet. Abdomen ovale, brillant, noir foncé, la marge apicale des segments 2, 3 et 4 frangée de pubescence argentée, surtout sur les côtés; l'anus légèrement fauve.—PC.

**9. Andrène perplexé.** *Andrena perplexa*, Smith, Cat. Brit. Mus. 1, p. 118, ♀♂.

♀♂—Long. .40 pce. Noire; avec poils blancs à la face, sur les côtés du thorax et les cuisses, et jaunes sur le disque du thorax, les jambes et les tarsees postérieurs. Chaperon nu, à punctuations grossières et peu denses, les côtés de la face et le vertex seulement fournis de poils. Thorax à poils courts et peu abondants, laissant tous les teguments à découvert, le métathorax avec un espace renfermé sur le disque, cet espace subtriangulaire et portant des stries