

coût dans les deux premières semaines qui suivront leur convalescence, au risque de voir réapparaître les anciennes lésions.

*Dangers de l'opération.*—Ils sont nuls ou à peu près. Les deux règles à suivre c'est d'opérer vite et selon toutes les lois de l'antiseptie.

L'hémorrhagie peut quelquefois être assez considérable. Le jet de l'irrigation continue chaude et la constriction des fils des sutures suffisent toujours à la contrôler. Une pince hémostatique provisoire pourra être requise dans quelques cas, mais avec notre maître, nous considérons la ligature des artères utérines comme superflue.

L'opération s'entoure parfois de quelques difficultés assez sérieuses quand le col est immobilisé au fond d'un vagin étroit et profond. L'étroitesse de la vulve peut être aussi une entrave, surtout si elle complique un de ces derniers états.

*Résultats :* Les déformations et traumatismes sont entièrement réparés. Le col retrouve sa forme normale et ses fonctions physiologiques. L'enlèvement de la muqueuse détermine une espèce de régression dans les tissus hypertrophiés.

Il y a suppression du catarrhe cervical, de la dysménorrhée et de la stérilité.

En somme, l'opération de Schröder répond à tous les desiderata.

Et dans les cas de grossesse ultérieure elle n'entrave nullement la gestation et l'accouchement. La dilatation est tout à fait régulière et normale et l'expulsion du fœtus n'est nullement retardée.

M. Ducasse (thèse de 1889) a bien établi cette dernière proposition. " Ces bons résultats, dit-il, tiennent à ce fait que le tissu cicatriciel est nul ou en si minime quantité qu'il n'a pu entraver la marche de la dilatation."

Un léger écoulement leucorrhéique peut dans quelques circonstances persister après l'opération, mais il n'est pas tenace et cèdera facilement à des injections antiseptiques régulières.

PARIS, avril 1891.

---

*Anesthésie par l'éther phéniqué.*—Le Dr RICHARDSON obtient l'anesthésie cutanée en employant sous forme de pulvérisation l'éther phéniqué ainsi préparé : Acide phéniqué 0 gr. 25. Ether nhydre 25 grs. L'anesthésie superficielle se produit avant le moment où le froid se manifeste et l'on peut alors pratiquer l'incision de la peau, en continuant les pulvérisations, la division des tissus plus profonds peut être pratiquée sans douleur. Cependant le procédé doit être réservé aux opérations de courte durée en raison des inconvénients qui pourraient résulter d'une absorption prolongée de l'acide phéniqué contenu dans le mélange.—*The Asclepiad.*