

Le premier suppositoire provoque, en général, un peu de ténesme. Mais d'ordinaire, le malade arrive rapidement à le surmonter et d'ailleurs il disparaît vite.

Il faut avoir grand soin d'empêcher les pollutions: un régime fortifiant, mais non excitant, est indiqué. Massage de la prostate, ergotine à l'intérieur, traitement local de l'urétrite chronique avec des astringents, etc.

PÉDIATRIE

Traitement des anorexies chez l'enfant, par MM. PÉRIER et GARTJOUX, dans les *Annales de médecine et de chirurgie infantile*, et *Journ. de Méd. et de Chirurg. prat.*, août 1909.

1° Régime. — Régler sévèrement les heures des repas, mais laisser un peu à l'enfant le choix de ses aliments (sous réserve toutefois de refus; en particulier, éviter les aliments vinaigrés ou épicés).

2° Vie en plein air; exercices physiques, mais sans fatigue: frictions quotidiennes matin et soir, à l'alcool camphré; ou bien hydrothérapie et massage. — L'été, cure d'altitude.

3° Prescrire des apéritifs et, s'il y a lieu, des eupéptiques:

Soit: Décoction de quinquina 30 gr. (à faire bouillir une demi-heure dans un litre d'eau, laisser reposer et filtrer).

Une cuillerée à café ou à soupe un quart d'heure avant les repas.

Soit :

Eau distillée	100 grammes.
Arrhéнал	0 gramme 10.
Sirop de quinquina	50 grammes.

(VARIOT.)

Deux cuillerées à café de 18 mois à 2 ans; une cuillerée à soupe de 2 à 4 ans; deux cuillerées à dessert de 4 à 8.

Soit, surtout si l'enfant a plus de six ans:

T. de noix vomique	} à 5 grammes.
T. de quassia	
T. de rhubarbe	
T. de colombo	
T. de gentiane	

(CARRIET.)