

HISTOIRE
NAT. DES
ANTILLES.

le porter, il est certain qu'on trouve à la Martinique un grand nombre de Serpens nuisibles. Le même Auteur en distingue particulièrement trois sortes: „ les uns, gris veloutés, & tachetés de noir en plusieurs endroits; les „ autres comme de l'or, & les troisiemes de couleur rouillé. Il croit volontiers, dit-il, que les premiers sont de véritables viperes, de celles qui ne portent gueres plus de deux piés de long. Quelques-unes sont plus grosses que „ le bras; & cette grosseur est égale, jusqu'à deux ou trois pouces de la queue, „ qui se termine tout-à-coup en pointe par un petit ongle: elles ont la tête „ platte, à-peu-près large comme la main, armée de quatre, & souvent de „ huit dents, qui sont ordinairement longues d'un pouce. J'en ai vu, continue du Terre, j'en ai même apporté en France, de longues comme la „ moitié du doigt, pointues comme des aiguilles, & courbées en forme de „ croc. Chacune est percée d'un petit trou, qui pénètre depuis la racine jusqu'au bout; & c'est par-là qu'elles font glisser le venin dans la plaie.”

Les autres, c'est-à-dire les jaunes & les roux, ont la tête en forme de triangle; & cette marque fait distinguer les Serpens dangereux, de ceux qui ne le sont pas. Ils sont bien armés aussi de dents aiguës, & d'une taille si démesurée, qu'il s'en trouve de la grosseur de la jambe, & de sept à huit piés de longueur. Les uns, comme les autres, naissent souvent d'une même Mere; ce qui fait croire à du Terre que les Mâles s'accouplent indifféremment avec les Femelles de chaque espece. „ Un jour, dit-il, il trouva une Vipere, „ grosse comme la jambe, & si foible qu'à peine pouvoit-elle se remuer, au „ milieu de plus de soixante petits Serpens de toutes les sortes, qu'elle venoit de mettre bas. Dans une autre occasion, il ouvrit plusieurs Femelles, „ dont les œufs étoient revêtus d'une membrane: mais il fait observer que „ ces œufs ne sortent jamais du ventre de la mere; que les petits s'y forment, „ mangent la coque & même la membrane qui les environne, & rongent „ quelquefois la mere même, jusques proche du nombril; ce qui n'arrive „ pas néanmoins à toutes les meres, car la plupart vivent après avoir fait leurs „ petits: elles en font même plusieurs fois dans une année.

„ Il a remarqué dans ces Viperes trois sortes de venin, dont la couleur „ & les qualités ne sont pas les mêmes. Leur venin est contenu dans de petites vessies, de la grosseur d'un pois, qui environnent les dents. Les jaunes „ ont le venin un peu jaunâtre, & plus épais que les autres, & c'est le moins „ dangereux: les grises l'ont, comme de l'eau un peu trouble; & les rousses „ clair comme l'eau de roche; c'est le plus subtil. Les unes & les autres se trouvent, en toute saison, dans toutes les parties de l'île: mais elles paroissent plus souvent dans le cours de Mai & d'Avril; tems où les „ Crabes & les Tourlouroux descendent des Montagnes, se nichent dans „ toutes sortes de trous, & les en font sortir. Les Rats & les Poules les „ attirent autour des Cases. Rencontrent-elles une Poule qui couve? elles „ se mettent sur les œufs, se font couvrir par la Poule, jusqu'à ce que les „ petits soient éclos, les avalent tout entiers, & mordent la Poule, qui „ meurt aussitôt de sa blessure. Elles ont la ruse de glousser & de contre- „ faire les Poules, pour attirer les Petits, après avoir tué la Mere. Sous

qu
pr
po
gr
cu
me
je
un
cer
pe
ma
An
lor
tir
chu
cer
En
neu
de
que
fix
c'é
nou
peti
requ
tre
fir
étoi
les t
ou c
des
coqu
resse
Petit
treize
six pe