

matin et soir, je fais donner au malade un lavement d'un litre d'eau bouillie additionnée d'une grande cuillerée de liqueur de Labarraque.

\* \* \*

Pour nous résumer voici l'ordonnance type qui peut convenir à une fièvre typhoïde de moyenne intensité:

1<sup>o</sup> Aérer la chambre; faire varier de temps en temps la position du malade;

2<sup>o</sup> Brosser chaque jour les dents avec une brosse chargée de la poudre suivante:

Carbonate de chaux précipitée .....	75 gr.
Poudre de savon .....	20 gr.
Perborate de soude .....	3 gr.
Camphre pulvérisé .....	2 gr.
Essence d'anis .....	vi gouttes

Faire ensuite laver la bouche avec la solution suivante tiède au bain-marie:

Naphtol .....	0 gr. 10
Perborate de soude .....	25 gr.
Eau distillée de menthe .....	200 gr.
Eau distillée q. s. pour .....	1 litre.

Assurer avec la même solution la propreté des lèvres, du pourtour de la bouche, des narines et des yeux.

3<sup>o</sup> L'alimentation comprendra: un litre et demi de lait frais écrémé, un demi-litre de bouillon dégraissé. En outre le malade usera de limonades fraîches, d'infusions aromatiques chaudes, de