

Carottes.—Semer de bonne heure, en rayons espacés d'un pied, dans un sol bien préparé, après avoir mêlé la graine avec deux fois son volume de terre bien sèche ou de tourbe, pour faciliter le semis. La variété dite "Early Hovin" est très-recommandable comme variété hâtive, on la sème dans un petit sillon large de deux pouces. Elle est courte, d'une saveur douce, pousse très-épaisse dans les rangs, et peut être éclaircie tout l'été pour subvenir aux besoins de la consommation, en commençant à l'époque des petits pois. Elle est également bonne pour l'hiver mais on lui préfère alors la variété orange longue dont le rendement est plus considérable.

Céleri et céleri rave.—Choisir quelques pieds de la couche chaude pour transplantation et la consommation en été. Semer de la graine, dans une terre chaude et riche, en lignes espacées de six pouces pour obtenir du plant pour la récolte principale. Les variétés rouges sont plus dures; les variétés blanches plus délicates, et les variétés géantes sont presque toujours creuses et insipides.

Capucines.—Semer préférablement la variété à fleurs jaunes, et dans un endroit où les courants pourront grimper et s'étendre en montrant leurs brillantes fleurs. Fumer abondamment et ne semer qu'à la fin du mois.

Cerfeuil.—Semer de temps en temps pour en avoir toujours de jeunes pousses pour le pot-au-feu.

Choux.—Semer la graine en pleine terre aussitôt que la température le permet. Transplanter des couches chaudes ou froides pour la consommation de l'été, à 1 pied et demi ou 2 pieds de distance. La variété hâtive d'York est celle qui donne les premiers fruits. Le Savoie est plus tardif mais supérieur. Les choux tardifs doivent être semés à la fin du mois pour la consommation de l'hiver ou de l'automne. Eviter l'emploi de tout fumier fermentescible, ou de semer sur terrain ayant donné des choux l'année précédente si on veut ne pas avoir à redouter les insectes et les pieds tournés.

Choux-fleurs.—Même soin que les choux ordinaires. Parmi les variétés hâtives se distingue le chou de Paris et parmi les variétés tardives le chou de Langres. Ils sont les plus délicats et les plus savoureux de tous les choux connus.

Choux de Bruxelles.—Ils sont caractérisés par une haute tige garnie de petites têtes de choux grosses comme des œufs de pigeon, et d'une délicatesse peu commune. Au reste leur culture est la même.

Choux-Raves.—Semer de bonne heure sur couche chaude ou plus tard en pleine terre. Mêmes soins que pour le chou ordinaire.

Champignons.—Préparer du fumier sous couvert pour fumer la couche et se procurer du blanc de champignon, qu'il est recommandable de partir à cette saison.

Concombres.—Les partir sur des morceaux de gazon et planter quelques graines parmi les laitues et les radis hâtives en couche chaude. Lorsque ceux-ci auront été arrachés, les concombres s'étendront dans toute la couche.

Couches Chaudes.—Pour le cultivateur les couches chaudes peuvent encore être établies avec avantage. Sur la terre sèche, il est placé

14 pouces de fumier de cheval, bien travaillé et pailleux sur lequel repose le cadre qui est ensuite entouré d'une bordure en fumier de six pouces de largeur. Le cadre sera fait en planches d'un pouce et demi, haut d'un pied en avant, c'est-à-dire du côté du sud, et en arrière assez haut pour donner aux châssis une pente suffisante à l'écoulement des eaux de pluie. Les châssis ont une largeur moyenne de $2\frac{1}{2}$ à 3 pieds et 5 pieds de longueur. Le cadre placé sur le fumier reçoit une couche de terre bien ameublie de 4 poussées d'épaisseur. On recouvre avec les vitreaux et du moment que la température s'est élevée suffisamment et que la terre est bien assise, on peut se... les choux bâties, la laitue, les tomates, le piment, les radis, etc.

Couches froides.—Laisser ouvertes, excepté par un temps très-froid ou par une pluie violente.

Citrouilles.—Les variétés naines doivent être plantées à 4 pieds de distance et les autres à 6. Si le sol n'est pas assez riche il faut placer du fumier sous les plants. Les citrouilles d'automne exigent beaucoup d'engrais et d'espace. Il ne faut pas cultiver deux variétés pour graines dans un voisinage de moins d'un demi arpent car il y aura très-probablement hybridation.

Cresson.—Semer le plus tôt possible en lignes espacées de six pouces. Les feuilles frisées sont propres aux salades et aux assaisonnements, en très-peu de temps.

Fèves.—Préparer des échelons. Il est indispensable pour assurer leur durée de tremper dans une dissolution de vitriol bleu, (sulfate de cuivre) l'extrémité mise en terre. Ce trempage devra durer plusieurs jours et mieux plusieurs semaines. On doublera ainsi leur durée. Les variétés de fèves hâtives doivent être semées vers la fin du mois.

Fruits.—Les petits arbustes fruitiers qui se placent dans le potager tels que les gadelliers, groseilliers, framboisiers, doivent être taillés et relevés si ce n'est déjà fait. On prétend que des débris de coquilles d'huîtres jetés aux pieds de ces arbres les préservent de la rouille.

Fraisiers.—C'est le moment de faire de nouveaux carrés et d'obtenir de nouvelles variétés.

Epinards.—Enlever les couvertures et cueillir selon les besoins de la table. Semer de temps en temps en lignes espacées d'un pied.

Funiers.—Pour le jardin ils doivent être bien décomposés et bien courts, nets de mauvaises graines. Tant mieux s'ils ont été mis en compost pendant tout l'hiver avec moitié tourbe.

Engrais liquide.—Galer un tonneau dans quelque coin du jardin, pour recevoir les eaux sales de la maison et le purin disponible. S'en servir copieusement au profit des plantes.

Graines.—Autant que possible il faut essayer toutes les graines en les faisant germer soit dans un morceau de coton humide, placé sous un verre, soit en les ensoufflant dans une terre chaude et humide. Pendant le semis, il faut mettre le plus grand soin à ne recouvrir les graines que de terre bien ameublie et non de motes dures et grosses. Pour faire germer plusieurs variétés de graines à la fois avant le