

le jour. Aucun agent, dit le docteur Lewis-Smith dans *American Journal of obstetric*, n'est préférable pour la constipation des enfants.—*Le Médecin Praticien*.

### Traitement de la fissure à l'anüs sans opération.—

Aux malades pussillanimes qui ne veulent de la dilatation forcée, moyen rapide et efficace pour guérir la fistule de l'anüs, M. le docteur Mascarel propose le traitement suivant qui lui a donné de nombreux succès :

1<sup>o</sup> Tous les jours prendre un lavement à l'eau tiède, additionné d'une grande cuillerée de glycérine.

2<sup>o</sup> Après chaque garde-robe terminée, introduire dans l'anüs, à l'aide d'un porte-mèche, une mèche de charpie du volume du petit doigt, bien enduite de la pommade ainsi préparée :

Glycérine et huile d'amandes douces ââ..... 3 i.  
Onguent de la mère..... 3 i.

3<sup>o</sup> Avant l'introduction de la mèche, avoir le soin de bien enduire le pourtour de l'anüs d'une couche abondante de la même pommade.

4<sup>o</sup> Si la constipation est très-prononcée donner tous les soirs dans une cuillerée de potage, à l'heure du dîner, 5 cent. de poudre de racine de belladone.

Huit fois sur dix la fissure est radicalement guérie après trois semaines ou un mois au plus de ce traitement.—*France médicale*.—*Lyon médical*.

### Traitement du l'urticaire chronique.—(Labbé).—Il faut recourir à l'usage de l'arséniate de soude à haute dose, 5 milligrammes à 1 centigramme par jour, et aux lotions de sublimé suivant la formule suivante :

Sublimé corrosif..... gr. xv.  
Eau distillée ..... 3 iij.  
Alcool ..... Q. s.—

Les malades adultes mettent une cuillerée à café de cette solution dans un demi-verre d'eau fraîche et pratiquent avec ce liquide des lotions sur les parties atteintes, quant surviennent les démangeaisons. Après quinze jours de traitement, la maladie est à peu près éteinte.