Essence de térébenthine ozonisée.	10 grammes.
Vaseline liquide.....	50 —

Mélez. Pour injections sous-cutanées.

Notre confrère relate quatre observations dans lesquelles ce traitement a été couronné d'un succès inespéré, vu la gravité des cas.

La première a trait à une femme atteinte d'ictère grave ; elle était dans un coma profond et présentait des convulsions urémiques, lorsque fut appelé M. Carreau qui institua immédiatement le traitement térébenthiné, d'abord à la dose de trois perles toutes les demi-heures, et de deux perles ensuite. La malade prit dans le courant de trente-six heures deux flacons de perles d'essence. À partir du moment où l'odeur de violette apparut dans les urines, l'albuminurie commença à diminuer, le coma fit place à une simple somnolence, et quelques jours après la convalescence s'établissait.

Chez un deuxième malade atteint de fièvre jaune avec vomissements incoercibles, notre confrère a pratiqué, en l'espace de trente-six heures, vingt-trois injections hypodermiques d'essence de térébenthine. Les symptômes se sont assez rapidement amendés et le malade a guéri, mais après avoir présenté deux abcès à la cuisse et au mollet gauches.

M. Carreau a encore employé avec le même succès les injections d'essence de térébenthine chez un autre malade, atteint de fièvre à urines noires très graves.

Dans la quatrième observation il s'agissait d'une fièvre bilieuse hémoglobinurique. L'administration d'une perle d'essence de térébenthine toutes les heures, puis toutes les demi-heures, étant restée sans effet, on fit prendre trois perles toutes les demi-heures, après quoi les symptômes s'amendèrent rapidement. Ce fait montre bien que, pour obtenir le résultat voulu, il faut administrer l'essence de térébenthine à hautes doses dans les ictères infectieux.—*Concours médical.*

Chlorure de zinc contre la sueur des pieds—WINOGROEFF s'est trouvé bien de l'emploi, pendant plusieurs années, d'une solution de chlorure de zinc de 5 à 8 pour 100. Voici sa manière d'agir : il commence par laver les pieds à l'eau tiède et à les sécher soigneusement. C'est alors qu'il badigeonne les parties affectées d'un pied avec un morceau d'ouate hydrophile mouillée dans la solution de chlorure de zinc : il n'essuie ce pied qu'après avoir badigeonné l'autre pied. Dans le cas où il existerait des ulcérations entre les orteils, il faut essuyer chaque pied immédiatement après l'avoir badigeonné pour s'opposer à une action trop énergique du chlorure de zinc. De plus, il ne faut alors se servir, au début, que d'une solution à 5 pour 100. Les badigeonnages doivent être entrepris le soir avant de se coucher pour