

légumes et céréales par l'eau en ébullition. Non-seulement les petits malades vivent avec ce régime qui peut sembler bien maigre aux non-initiés, mais la balance montre une augmentation de la courbe de leurs poids, même après une semaine, sans autre nourriture.

Après quelques jours de notable amélioration, il arrive parfois que la diarrhée reprend dès qu'on revient au lait, pour cesser de nouveau, du jour au lendemain, si on remet l'enfant aux bouillons végétaux.

Voici deux formules :

BOUILLON VÉGÉTAL DE MERY.

Pommes de terre.....	}	de chaque
Carottes		2 onces
Navets.....	}	de chaque
Fèves.....		1 once
Pois secs.....		1 pinte
Eau.....		

Faire bouillir pendant 3 heures. Laisser tiédir et ramener la quantité ce liquide à une pinte en ajoutant ce qu'il faut d'eau bouillie. Couler, à travers une mousseline très propre et ajouter une petite cuillerée à thé de sel de cuisine. Conserver dans un récipient qu'on plonge dans une chaudière d'eau glacée. Ne pas en garder plus que 24 heures.

BOUILLON DE CÉRÉALES (COMBY-SPRINGER)

Blé.....	}	De chaque
Orge.....		2 cuillerées
Avoine.....		à soupe.
Seigle.....		
Blé d'Inde concassé.....		
Fèves.....		

Même préparation que pour la formule précédente.

Après 12 à 24 heures de diète à l'eau et même sans diète à l'eau préalable, on commence à donner l'un ou l'autre ou l'un et l'autre des bouillons. Après sédation de la plupart des symptômes diarrhéiques, au lieu de revenir au lait trop vite, on ménagera "un régime de transition" en faisant des bouillies aux farines de blé, riz, tapioca, sagon, etc, qu'on delayera avec ces bouillons, en portant au feu comme pour toutes les bouillies.

Six à huit cuillerées de bouillon delayeront 1 à 2 cuillerées de farines.

On peut se servir de ces bouillons, au lieu d'eau bouillie pour le coupage du lait.