

MM. Les étudiants de l'Ecole saluent l'entrée du doyen des Chirurgiens de l'Hopital, M. le Dr P. Munro, par une vive salve d'applaudissements.

L'opération prérectale, dite de Nélaton, a été choisie de préférence à la latérale, parcequ'elle donne un espace plus considérable par l'incision des deux cotés de la prostate et facilite par conséquent l'extraction des gros calculs.

Malgré cette large incision, l'extraction de la pierre a été très difficile, il a fallu exercer des tractions très énergiques durant plusieurs minutes pour réussir à l'extraire : une certaine hémorrhagie a nécessité, par prudence, l'introduction de la canule à chemise de Dupuytren.

Durant les quinze jours qui suivirent l'opération, la température n'a pas dépassé $39\frac{1}{2}$, le pouls a atteint 104.

La plaie a présenté durant longtemps une apparence diphthéritique, puis elle est devenue vermeille ; cependant la cicatrisation a été très lente, ce qui n'est pas surprenant vu la constitution délabrée du patient.

Le calcul pèse 3iii et 3ii et mesure 8 pouces dans sa plus grande circonférence.

L'urine n'a commencé à passer par les voies naturelles que le 25ième jour après l'opération.

Le malade a pris des forces, toutes les fonctions se font bien, et la guérison est assurée. Le malade ne cesse de témoigner sa reconnaissance et d'exprimer le bien être qu'il éprouve depuis l'opération.—(A continuer)

KYSTES DES OVAIRES.

C'est dans la Gynécologie que la Chirurgie a fait le plus de progrès de nos jours, et ses résultats maintenant sont véritablement remarquables dans l'ovariotomie.

Cette opération a été faite pour la première fois en 1809, dans le Kentuckey, par le Dr. Ephraïm McDowell. Sur treize