## 2° Fistules anales, 3. Débridement.

## Chirurgie du membre supérieur.

1° Panaris de l'annulaire droit. Ouverture.

2° Nécrose de la tère phalange de l'index gauche après amputation du doigt, 1. Désarticulation et amputation de la tête du métacarpien.

3° Phlegmon de la main, 1. Ouverture.

4° Phlegmon de l'avant bras et du bras, 1. Ouverture, drainage.

5° Lipôme de l'épaule gauche, 1. Ablation.

6° Luxation de l'épaule, 2. Réduction par le procédé de

Kocher pour un cas et Mothe pour l'autre.

7° Sarcôme développé sur le tiers supérieur de l'humérus avec envahissement de la clavicule et de l'omoplate, 1. Désarticulation inter-scapulo-thoracique.

## Chirurgie du membre inférieur.

1° Plaie par arme à feu de la région fessière, 1. Ouverture, drainage.

2° Coxalgie, 1. Immobilisation par un bandage plâtré.

3° Abcès ossissent de l'aine, 1. Ponction, injection d'éther iodoformé.

4º Bubons, I. Ablation.

5° Abcès ossifluent de la cuisse, r. Ponction, injection d'éther iodoformé.

6° Ostéomyélite traumatique de la jambe, 1. Curettage, ablation de séquestres, trépanation.

7° Fracture de jambe 1/3 moyen, 1. Attelles plâtrées de Maisonneuve.

8° Fracture ouverte de la jambe, 1. Amputation de la cuisse après deux désinfections sous chloroforme sans succès.

9° Ecrasement du pied, 1. Désarticulation de Chopart pour septicémie sans succès. Amputation de la jambe cinq jours après

10° Ongle incarné, 2. Ablation de l'ongle et de la ma-

trice.

11° Pied bot, varus équin, 1. Ténotomie, plâtre.

## DR. ACHILLE PAQUET,

Médecin interne de l'Hôtel-l'eu, Québec.