

germe en haut, puis recouverts de terre fine jusqu'au dessus des germes. Il faudra les soustraire contre la température froide, au moyen de chassis ou paillassons. Il sera bon d'arroser immédiatement après cette opération, et de temps à autre, lorsque la terre devient trop sèche. Un chevelu compact se forme aussitôt autour de chaque tubercule qui pourra alors être enlevé avec une motte de terre qui y adhère et être planté en pleine terre, lorsque la saison le permettra, dans des rigoles de deux pouces de et les plants distants de douze pouces les uns des autres. Par ce procédé, on obtient une avance d'un ou même deux mois sur la récolte ordinaire des pommes de terre.

CHOSSES ET AUTRES

Plantation de végétaux ligneux à feuilles caduques.—L'époque la plus favorable pour faire cette plantation dans les terrains légers ou de consistance moyenne est à l'automne. C'est au printemps pour les sols compactes et à humidité surabondante.

Lors de la plantation de ces arbres, il est nécessaire de conserver la plus grande étendue possible aux racines, et pour cette opération, il faut aussi supprimer sur la tige une quantité de branches à peu près égale aux pertes éprouvées par les racines.

Le badigeonnage des tiges de ces arbres au printemps même de leur transplantation est excellent pour aider à leur reprise.

* *

Distribution des plantes fourragères aux bestiaux.—Cette opération a une grande importance dans une ferme, car si les plantes fourragères sont distribuées aux bestiaux avec soin il y aura grand profit ; elles seraient consommées en pure perte dans une exploitation mal dirigée, que la nourriture soit distribuée avec trop de ménagement ou en trop grande quantité à la fois.

* *

Destruction des insectes dans le verger.—Lorsque votre verger est infesté d'insectes, vous devez lui accorder les plus grands soins. D'abord vous étalerez autour d'un arbre que vous voudrez débarrasser d'insectes une large toile, puis vous raclez les mousses et les vieilles écorces qui donnent abri aux œufs des insectes parasites. Avec un instrument tranchant, vous raviverez les nudosités et les chancre qui se trouvent sur l'arbre, puis vous badigeonnerez l'arbre, surtout à la naissance des branches et dans les nudosités, avec une solution d'eau de savonneuse, de la suie et du soufre, le tout mêlé dans un baquet d'eau de chaux où vous aurez délayé de l'argile pour donner au tout la consistance d'une pâte.

Il faut opérer de préférence à l'automne, les pluies d'hiver feront lentement descendre votre mélange au collet de l'arbre, où les pucerons se réfugient. Les chancre sècheront promptement, la sève viendra les recouvrir, l'écorce sera nette, et les arbres végèteront plus facilement et avec force.

Récolte des pommes de terre.—Le dessèchement naturel des pommes de terre indique qu'elles ont atteint leur maturité, et qu'il est temps de les arracher. Cependant le cultivateur ferait erreur s'il rentrait ensemble et en mettant sur le même tas les pommes de terre dont les feuilles ont été grillées, soit par une saison pluvieuse ou très chaude.

Les pommes de terre qui se trouvent sous les feuilles grillées sont entachées de la maladie, et elles peuvent, au moyen du contact, par leur pourriture, gâter les tubercules sains, et par suite occasionner une perte considérable que le cultivateur peut éviter en faisant le choix sur le terrain de la récolte. Ce choix permettrait de les consommer ou de les vendre de suite.

* *

Choix des arbres fruitiers pour la plantation.—Ce choix est de la plus haute importance, puisqu'il assure la plus ou moins longue durée des arbres fruitiers.

Pour qu'un arbre fruitier soit bien constitué, il faut que le corps de l'arbre soit plus gros que celui de la greffe, ou du moins d'égale grosseur. Si la greffe est plus grosse que le sujet, si un bourrelet volumineux marque le point de jonction, il y a antipathie entre les deux êtres unis ensemble : dans ces conditions, l'arbre est et sera mauvais.

L'arbre à être planté doit avoir une écorce lisse et saine.

Il faut que les branches qui émergent de la tige aillent en décroissant de bas en haut, et non pas, ce qui a lieu le plus souvent que les branches inférieures soient plus fortes que les supérieures. Si c'est un petit rejeton tendre et flexible, il faut que le bois soit bien aoûté et les yeux bien constitués.

Pour compléter ce qui a trait à l'arbre, il faut ajouter que les branches et les racines froissées ou mutilées devront être coupées avec une serpe bien aérée, que la section des racines devra être faite de telle sorte qu'une fois l'arbre planté elle repose à plat sur le sol.

* *

Cueillette des fruits.—Pour cueillir les cerises, les prunes et les pommes voici un moyen facile et peu dispendieux à adopter : Prenez huit, dix ou douze bouts de gros fil de fer flexible, longs de 1 pied chacun que vous fixerez, au moyen d'une douille, à un long manche, ayant soin de placer les fils de fer les uns près des autres, suivant la grosseur des fruits à cueillir ; ainsi pour les cerises, ils doivent être plus rapprochés que pour les prunes et les pommes.

Il faut donner à ces fils de fer une courbure imitant la forme d'un vase et la douille où elles sont fixées sert en même temps à recevoir un manche de longueur convenable.

Pour cueillir le fruit, on l'engage entre les branches flexibles de l'instrument : une légère torsion le détache et le fait tomber à l'intérieur. L'extrémité des fils de fer doit être courbée partie en dedans, partie en dehors pour permettre de saisir les objets dans différentes positions. Les fils de fer qui varient quelque peu de longueur et d'écartement, suivant les fruits à cueillir, forment un vase ou gobelet qui permet de recevoir un assez grand nombre de fruits sans les endommager et sans ramener à soi l'instrument jusqu'à ce que le vase soit à peu près rempli.

English Spavin Liniment — Fait disparaître les tumeurs dures ou calleuses, provenant d'accidents chez les chevaux, vessigons, gourmes, suros, entorses, gonflement de la gorge, toux, etc. L'usage d'une bouteille de ce médicament épargne \$50