

Tous les tissus épithéliaux servent au développement du gonocoque. Le tissu conjonctif, qu'il soit recouvert d'un épithélium ou d'un endothélium, peut également être envahi par le microbe de Neisser.

La blennorrhagie est avant tout *une affection épithéliale accompagnée d'une inflammation purulente du tissu conjonctif sous-jacent.* (M. Touton).

Ce dernier auteur décrit ainsi les altérations de la gonorrhée. " Les principaux résultats du processus blennorrhagique dans un tissu sont : la prolifération du gonocoque dans les espaces inter-cellulaires, la turgescence des cellules épithéliales, l'invasion des espaces intercellulaires par des globules de pus, la destruction et l'élimination des cellules épithéliales ; à côté de cela on observe " une infiltration cellulaire du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif " peut, dans certains cas, être mis complètement à nu par la destruction de son revêtement épithélial ; d'après Dinkler, il peut " aussi se produire de la nécrose et des thromboses.

" Lorsque le processus morbide est superficiel et de courte durée, la guérison a pour résultat une restitution *ad integrum* ; lorsque son siège est plus profond et qu'il dure longtemps, l'affection " se termine par une rétraction cicatricielle du tissu conjonctif : " les tissus conjonctifs recouverts d'un endothélium présentent une " grande tendance à la production d'adhérences entre surfaces qui " se touchent.

" Le gonocoque peut donner lieu à une dégénérescence ou à " une prolifération de l'épithélium : cet épithélium hyperplastique " donne facilement naissance à des érosions par suite d'une macération des éléments épithéliaux et d'une dénudation du tissu conjonctif sous-jacent.

" Les cellules du tissu conjonctif peuvent aussi entrer en prolifération sous l'influence d'une invasion de gonocoque.

" Les affections que nous voyons se produire en divers points " éloignés du corps consécutivement à une blennorrhée primitive

" peuvent
" me éta
" (métas
" ganes
" infecté

" Le
" vis-à-vi
" soit ho
" qui n'é
" et se m
" ces lym

" De
" dans la
" du tiss
" daire p
" superfi
" épithél
" dans le
" produi
" que cel
" tion."

Le g
d'autres
Cett
été sava

L'ur
pas bien
nismes q
cocci et
globulair
leucocyt