

Gen. CORBEAU. *Corvus*. Linné.

Bec très fort, beaucoup plus haut que large à la base, à sommet très arqué. Narines grandes, circulaires, couvertes en arrière par une membrane, et garnies de longues plumes soyeuses. Ailes atteignant presque l'extrémité de la queue. Queue graduée ou arrondie.

1. **Le Corbeau carnivore.** *Corvus carnivorus*, Bart. *C. corax*, Wils. *C. lugubris*, Agass.—Vulg. *Le Corbeau*; Angl. *American Raven*.—Longueur 2 pieds; ailes 17 pouces; queue 10 pouces. Entièrement noir, avec réflexions violettes; 4^e penne aïaire la plus longue. Plumes de la gorge et du menton raides, étroites, lancéolées.

Séd. et AR.—On dit que les Corbeaux sont d'autant plus communs que les Corneilles sont rares; aussi rencontre-t-on assez rarement ce brigand de la gent volatile dans la Province de Québec où les Corneilles sont si nombreuses. Le Corbeau niche sur les rochers escarpés ou les montagnes solitaires; il pond 4 à 5 œufs bleus tachetés de brun.

2. **Le Corbeau d'Amérique.** *Corvus Americanus*, Aud. *C. corone*, Wils.—Vulg. *La Corneille*; Angl. *The common Crow*.—Longueur 19 à 20 pouces; ailes 13 à 14; queue 8 pouces. D'un beau noir avec réflexions violettes, jusque sur le ventre. Plumes de la gorge et du menton courtes, larges, obtuses.

Séd. et CC. On peut dire que la Corneille est à présent sédentaire dans les environs de Québec, puisque tous les hivers on en rencontre quelques unes qui n'ont pas voulu se soumettre à l'émigration, bien qu'elles paraissent souffrir quelque peu de la rigueur de notre température, et qu'elles aient peine aussi à se procurer la nourriture, tant que dure la neige. La Corneille se montre très commune tout l'été, surtout près des rivages, où les limaçons et autres insectes aquatiques lui offrent une nourriture abondante. Elle construit en Juin un énorme nid dans quelque conifère, à une grande hauteur du sol, et pond 5 œufs d'un beau bleu tachetés de roussâtre.

On voit, en automne, les Corneilles se réunir en bandes considérables avant de se mettre en route pour les climats du Sud. Il arrive assez souvent que les Corneilles se rendent nuisibles par leurs déprédations, dans les champs