MANIÈRE DE PRENDRE LE SIROP ROCHE

Le *Sirop Roche* ne trouble pas la digestion, c'est au contraire un puissant stimulant de l'appétit : on le prendra donc avec avantage une demi-heure avant les repas.

On peut aussi le prendre à toute heure de la journée et sans inconvénient, même au moment des repas, soit pur, soit dans de l'eau ou de la tisane.

L'action du *Sirop Roche* se fait déjà sentir dès le premier ou le deuxième flacon. Cependant, chez certains malades atteints plus gravement, il est nécessaire d'en faire usage prolongé. Mais toujours le malade finit par en obtenir un effet bienfaisant.

Quelquefois il sera nécessaire de recourir aux doses élevées (5 à 6 cuillerées à soupe par jour), sans que de ce fait on ait à craindre le moindre trouble fonctionnel, puisque le Thiocol n'est pas toxique. Il a été administré pendant des mois entiers à doses massives (10 à 15 grammes par jour) et avec le plus grand succès.

Le miel contre l'érysipèle

Un médecin anglais, M. Hayward, ayant entendu parler de l'emploi du miel contre l'érysipèle comme remède populaire, l'a essayé dans plusieurs cas graves et en été très satisfait.

On l'emploie en applications externes : un linge est enduit avec une couche de miel et appliqué sur la partie atteinte. Le topique doit être renouvelé tous les trois ou quatre heures.

Messieurs les médecins désirant obtenir des informations spéciales sur le traitement par l'Alcoïdothérapie Dosimétrique sont priés de vouloir bien s'adresser au Directeur de ce journal, qui se fera un plaisir de leur faire parvenir à titre gracieux la littérature et les échantillons nécessaires pour leur permettre de tenter l'expérience de ces médicaments.

Les médecins ayant l'intention de participer au Congrès International Dosimétrique devant avoir lieu à Paris le 2 juillet, peuvent également se renseigner à l'administration qui se met à la disposition de ses abonnés et amis pour leur être utile et agréable.

Toute correspondance recevra une attention particulière.

L'adresser au Directeur de la DOSIMÉTRIE AU CANADA,

Tiroir 2178, Poste Restante, Montréal.

Ce traitement donne d'excellents résultats, les douleurs disparaissent, en même temps que les nausées, et le cours de la maladie est beaucoup abrégé.

Les remèdes internes habituels contre la fièvre et pour stimuler l'appareil excréteur doivent être administrés en même temps. La convalescence se déclare habituellement au bout de trois ou quatre jours.

L'exercice de la Médecine au Brésil

On écrit de San-Paolo (Brésil), que le Gouvernement brésilien donne le droit d'exercer leur profession aux médecins étrangers ayant passé leur thèse dans une grande Université, sans soutenir comme auparavant une thèse en langue portugaise, très difficile pour les médecins étrangers et sur simple autorisation. C'est un immense débouché pour les jeunes médecins, les médecins faisant absolument défaut au Brésil.

A VENDRE

Une jolie boîte en bois de rose, contenant les APPAREILS nécessaires pour les EXAMENS DE L'URINE.

Une occasion est offerte.

S'adresser à la Direction de la DOSIMÉTRIE,
Tiroir de Poste 2178.

100 flacons de Sérum Antidiphthérique

de L'INSTITUT PASTEUR de LILLE

A VENDRE au prix de 50c. le Flacon

S'adresser à DART & CHAPMAN,

641, rue Craig.