fait, il se trouvait à porter les hydatides mêmes, ce qui est beaucoup plus dangereux, puisque celles-ci peuvent souvent causer la mort, ce que ne produisent pas d'ordinaire les vers à l'état parfait. Le *Medical Press*, dans son numéro de Janvier dernier, relatait un cas, où, la présence d'une semblable hydatide, probablement celle du cénure, causa la mort. La patiente était une femme qui commença par se plaindre d'un violent mal de tête. Après 10 mois, on s'aperçut que son esprit s'affaiblissait sensiblement; plus tard, se manifesta un vomissement d'un caractère alarmant, avec difficulté d'avalier, rétention d'urine et paralysie du sphincter de l'anus. Cinq mois avant la mort, le côté gauche fut complètement paralysé, avec dyspnée et faiblesse de la vue—d'abord du côté droit—puis de celui de gauche. L'examen *post mortem* révéla la présence d'une énorme hydatide dans la tête, occupant tout le lobe antérieur de la cervelle.

Un médecin de cette ville nous disait dernièrement que depuis environ un mois, il n'avait pas traité moins de 15 personnes affectées du ver solitaire. C'est là une preuve évidente qu'il se vend sur nos marchés des viandes détériorées qui compromettent ainsi la santé publique. Nos autorités civiques devraient veiller à ce que les réglemens à cet égard fussent strictement observés, car c'est plus particulièrement dans les villes que la santé du peuple a à souffrir de la mauvaise qualité des aliments offerts à la consommation.

A propos du ver solitaire, nous avons conseillé, comme le remède le plus efficace contre ce parasite, la graine de citrouille, page 146, Vol. I.

Un docteur Griggs, du Connecticut, indiquait comme suit, dans le *Medical Reporter* de Philadelphie, en Septembre dernier, la manière dont il employait ce médicament, qui, dans aucun cas, ajoutait-il, ne lui avait fait défaut. Je prends 6 onces de graines de citrouille, je les réduis dans un mortier, en poudre grossière, je mets ensuite cette poudre dans un vase en y ajoutant une pinte d'eau et je laisse reposer le tout pendant 10 à 12 heures; je passe ensuite le contenu, après l'avoir agité, dans un tamis, et j'ajoute de l'eau, si nécessaire, pour amener le liquide à une consistance laiteuse un peu épaisse. Une bonne dose de ce liquide, prise à jeûn, ne manque jamais d'opérer efficacement. Ce médecin rapporte avoir employé ce médicament sur un fermier de 50 ans, de forte constitution, et 6 heures après il envoyait un ver de 17 pieds, avec tête et tout le reste. Une autre fois sur une Dlle. de 30 ans, de constitution assez faible, et 5 heures après, elle déchargeait un ver mesurant 18½ pieds, portant aussi sa tête comme dans le premier cas.