

sus du corps gris, entremêlé de noir ; oreilles blanchâtres ; queue très fournie, annelée de blanc et de gris. Le raton mesure environ deux pieds. Sa fourrure est surtout recherchée pour les capots et les garnitures de voitures d'hiver. Le raton laveur se rencontre depuis la Baie d'Hudson jusqu'au golfe du Mexique

Genre BLAIREAU (*Meles*, Briss.)—Les blaireaux ont 36 dents ; leurs corps est trapu, bas sur jambes, leurs mains sont armées d'ongles longs et robustes, propres à fouir la terre ; leur queue est courte, velue. Ils portent deux mamelles pectorales et quatre ventrales.

Le **Blaireau de la Baie d'Hudson**, *Meles Hudsonius*, Cuvier. *Meles Labradoricus*, Harlan. *Ursus Labradoricus*, Lin. *Taxus Labradorica*, Desm. *American badger*.—C'est un animal de 18 à 24 pouces, d'un gris brun avec les jambes noires. Peu différent du blaireau d'Europe, il possède cependant des caractères assez marqués pour former une espèce distincte. Il se trouve au Labrador à la Baie d'Hudson, etc.

Genre GLOUTON (*Gulo*, Lin.)—Les Gloutons ont 38 dents incisives, 8 ; canines, 1—1 ; molaires, 8—8. Corps plus ou moins effilé ; queue un peu courte. Ce genre n'a qu'un seul représentant dans notre faune, le carcajou. Voir la description que nous en avons donnée dans le N^o. 6 du NATURALISTE, page 129.

(A continuer.)

ETUDE

SUR

LA MORT APPARENTE ET RÉELLE.

PAR J. A. CREVIER, M. D.

Ce serait peu consolant pour le public en général, si les médecins du dix-neuvième siècle, (le siècle des lumières,) ne pouvaient constater d'une manière certaine et évidente, si la mort d'une personne n'est qu'apparente ou réelle.